

Index	Substance	Annex	Druh zvířete	MRLs	Název tkáně	Jiná ustanovení
1.1	Estradiol-17β	II	všechny druhy savců produkující potraviny			pouze pro terapeutické a zootechnické použití
1.2	Progesterone	II	skot, ovce, kozy, lichokopytníci (samice)			pouze pro intravaginální terapeutické nebo zootechnické použití v souladu s opatřeními direktivy 96/22/EC
1.3	Testosterone	-				
1.4	Zeranol	-				
1.5	Trenbolon acetate	-				
1.6	Carbadox	-				
1.7	Bovine somatotropins	-				
1.8	Melengestrol acetat	-				
2.1	Dexamethasone	I	skot skot, prasata, lichokopytníci	0,3 µg/kg 0,75 µg/kg 2 µg/kg 0,75 µg/kg	mléko sval játra ledviny	
3.1	Azaperon	I	prasata	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	sval kůže a tuk játra ledviny	
4.1	Carazolol	I	prasata skot	5 µg/kg 5 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 5 µg/kg 5 µg/kg 15 µg/kg 15 µg/kg 1 µg/kg	sval kůže a tuk játra ledviny sval tuk játra ledviny mléko	
5.1	Spectinomycin	I	všechna potravinová zvířata kromě ovcí ovce	300 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg 5 000 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 5 000 µg/kg 200 µg/kg	sval tuk játra ledviny mléko sval tuk játra ledviny mléko	nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum
5.2	Neomycin	I	všechna potravinová zvířata	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 5 000 µg/kg 1 500 µg/kg 500 µg/kg	sval tuk játra ledviny mléko vejce	

5.3	Gentamicin	I	skot prasata	50 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 750 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 750 µg/kg	sval tuk játra ledviny mléko sval kůže a tuk játra ledviny	
5.4	Ceftiofur	I	skot prasata	1 000 µg/kg 2 000 µg/kg 2 000 µg/kg 6 000 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 2 000 µg/kg 2 000 µg/kg 6 000 µg/kg	sval tuk játra ledviny mléko sval kůže a tuk játra ledviny	
5.5	Sulphadimidine	I	všechna potravinová zvířata skot, ovce, kozy	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	sval tuk játra ledviny mléko	
5.6	Flumequine	I	všechna potravinová zvířata kromě skotu, ovcí, koz, prasat, drůbeže a ryb skot, ovce, kozy prasata drůbež ryby	200 µg/kg 250 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 400 µg/kg 250 µg/kg 800 µg/kg 1 000 µg/kg 600 µg/kg	sval tuk játra ledviny sval tuk játra ledviny mléko sval kůže a tuk játra ledviny sval kůže a tuk játra ledviny sval a kůže v př. poměru	nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum

5.7	Lincomycin	I	všechna potravinová zvířata	100 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 150 µg/kg 50 µg/kg	sval tuk játra ledviny mléko vejce	
5.8	Thiamphenicol	I	skot kur domácí	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	sval tuk játra ledviny mléko sval kůže a tuk játra ledviny	nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum
5.9	Danofloxacin	I	všechna potravinová zvířata kromě skotu, ovcí, koz a drůbeže skot, ovce, kozy drůbež	100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 30 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	sval tuk játra ledviny sval tuk játra ledviny mléko sval kůže a tuk játra ledviny	nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum
5.10	Spiramycin	I	skot prasata kur domácí	200 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 250 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg 400 µg/kg	sval tuk játra ledviny mléko sval játra ledviny sval kůže a tuk játra	
5.11	Sarafloxacin	I	kur domácí lososovití	10 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	kůže a tuk játra sval a kůže v př. poměru	

6.1	Closantel	I	skot ovce	1 000 µg/kg 3 000 µg/kg 1 000 µg/kg 3 000 µg/kg 1 500 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 5 000 µg/kg	sval tuk játra ledviny sval tuk játra ledviny	
6.2	Ivermectin	I	skot prasata, ovce, lichokopytníci vysoká, včetně sobů	40 µg/kg 100 µg/kg 20 µg/kg 15 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 20 µg/kg	tuk játra tuk játra sval tuk játra ledviny	
6.3	Flubendazole	I	prasata, kur domácí, krůty, pernatá zvěř kur domácí	50 µg/kg 50 µg/kg 400 µg/kg 300 µg/kg 400 µg/kg	sval kůže a tuk játra ledviny vejce	
6.4	Thiabendazole	I	skot	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	sval tuk játra ledviny mléko	
6.5	Triclabendazole	I	skot, ovce	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	sval játra ledviny	nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum
6.6	Levamisole	I	skot, ovce, prasata, drůbež	10 µg/kg 10 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	sval tuk játra ledviny	
6.7	Febantel, Fenbendazole and Oxfendazole	I	skot, ovce skot, ovce, prasata, lichokopytníci	10 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	mléko sval tuk játra ledviny	
6.8	Moxidectin	I	skot, ovce, lichokopytníci skot	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 40 µg/kg	sval tuk játra ledviny mléko	

6.9	Doramectin	I	skot prasata, ovce vysoká, včetně sobů	10 µg/kg 150 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 30 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 30 µg/kg	sval tuk játra ledviny sval tuk játra ledviny sval tuk játra ledviny	nepoužívat u dojnic, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum
6.10	Abamectin	I	skot ovce	10 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 50 µg/kg 25 µg/kg 20 µg/kg	tuk játra sval tuk játra ledviny	nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum
6.11	Eprinomectin	I	skot	50 µg/kg 250 µg/kg 1 500 µg/kg 300 µg/kg 20 µg/kg	sval tuk játra ledviny mléko	
7.1	Diclazuril	II	všechna přežvýkavá zvířata, prasata			pouze pro orální použití
7.2	Imidocarb	I	skot, ovce skot	300 µg/kg 50 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 50 µg/kg	sval tuk játra ledviny mléko	nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum
8.1	Izometamidium	-				
8.2	Diminazene	-				
9.1	Cyhalothrin	I	skot	500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	tuk ledviny mléko	další ustanovení jsou komentována v Council Directive 94/29/EC
9.2	Dicyclanil	I	ovce	200 µg/kg 150 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	sval tuk játra ledviny	nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum
9.3	Trichlorfon	-				

9.4	Deltamethrin	I	skot, ovce skot ryby	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg	sval tuk játra ledviny mléko sval a kůže v př. poměru	nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum
9.5	Phoxim	I	ovce prasata	50 µg/kg 400 µg/kg 50 µg/kg 20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	sval tuk ledviny sval kůže a tuk játra ledviny	nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum
		III	kur domácí	50 µg/kg 550 µg/kg 25 µg/kg 50 µg/kg 60 µg/kg	sval kůže a tuk játra ledviny vejce	prozatímní MRLs platí do 1.7.2005