

Österreich



Kombinierte Warnhinweise

Raucher sterben früher

Lebenslange Raucher verlieren im Durchschnitt 14 Jahre ihres Lebens

Raucher sterben früher

Raucher sterben früher

Raucher sterben früher

Rauchen führt zur Verstopfung der Arterien und verursacht Herzinfarkte und Schlaganfälle

Das Risiko, einen Schlaganfall zu bekommen ist ungefähr 50% höher bei Rauchern als bei Nichtrauchern

Rauchen führt zur Verstopfung der Arterien und verursacht Herzinfarkte und Schlaganfälle

Rauchen führt zur Verstopfung der Arterien und verursacht Herzinfarkte und Schlaganfälle

Rauchen führt zur Verstopfung der Arterien und verursacht Herzinfarkte und Schlaganfälle

Rauchen verursacht tödlichen Lungenkrebs

Rauchen verursacht tödlichen Lungenkrebs

Rauchen verursacht tödlichen Lungenkrebs

Rauchen verursacht tödlichen Lungenkrebs

Rauchen macht sehr schnell abhängig: Fangen Sie gar nicht erst an!

Rauchen macht sehr schnell abhängig: Fangen Sie gar nicht erst an!

Rauchen macht sehr schnell abhängig: Fangen Sie gar nicht erst an!

011 15 2 67
Rauchen macht sehr schnell abhängig: Fangen Sie gar nicht erst an!

Wer das Rauchen aufgibt, verringert das Risiko tödlicher Herz- und Lungenerkrankungen

Das Risiko von Herzkranz-Erkrankungen reduziert sich nach 1-jähriger Rauchabstinenz um 50%

Wer das Rauchen aufgibt, verringert das Risiko tödlicher Herz- und Lungenerkrankungen

Wer das Rauchen aufgibt, verringert das Risiko tödlicher Herz- und Lungenerkrankungen

Wer das Rauchen aufgibt, verringert das Risiko tödlicher Herz- und Lungenerkrankungen

Rauchen kann zu einem langsamen und schmerzhaften Tod führen

Rauchen kann zu einem langsamen und schmerzhaften Tod führen

Rauchen kann zu einem langsamen und schmerzhaften Tod führen

Rauchen kann zu einem langsamen und schmerzhaften Tod führen

Rauchen läßt ihre Haut altern

Rauchen kann die Spermatozoen schädigen und schränkt die Fruchtbarkeit ein

Rauchen kann die Spermatozoen schädigen und schränkt die Fruchtbarkeit ein

Rauchen kann die Spermatozoen schädigen und schränkt die Fruchtbarkeit ein

Rauchen kann die Spermatozoen schädigen und schränkt die Fruchtbarkeit ein

Rauchen kann zu Durchblutungsstörungen führen und verursacht Impotenz

Rauch enthält Benzol, Nitrosamine, Formaldehyd und Blausäure

Rauchen in der Schwangerschaft schadet Ihrem Kind

Schützen Sie Kinder: Lassen Sie sie nicht Ihren Tabakrauch einatmen

Schützen Sie Kinder: Lassen Sie sie nicht Ihren Tabakrauch einatmen

Schützen Sie Kinder: Lassen Sie sie nicht Ihren Tabakrauch einatmen

Schützen Sie Kinder: Lassen Sie sie nicht Ihren Tabakrauch einatmen

Ihr Arzt oder Apotheker kann Ihnen dabei helfen, das Rauchen aufzugeben

Sie können es schaffen, wir können helfen

Ihr Arzt oder Apotheker kann Ihnen dabei helfen, das Rauchen aufzugeben

Rauchen ist eine ernste Nikotin-Abhängigkeit; haben Sie keine Angst, um Hilfe zu bitten

Ihr Arzt oder Apotheker kann Ihnen dabei helfen, das Rauchen aufzugeben

Ihr Arzt oder Apotheker kann Ihnen dabei helfen, das Rauchen aufzugeben

Hier finden Sie Hilfe, wenn Sie das Rauchen aufgeben möchten

0803 00 00 00

Wählen Sie die Freiheit, wir helfen Ihnen

Hier finden Sie Hilfe, wenn Sie das Rauchen aufgeben möchten

Hier finden Sie Hilfe, wenn Sie das Rauchen aufgeben möchten: 0803 00 00 00

Hier finden Sie Hilfe, wenn Sie das Rauchen aufgeben möchten: 0803 00 00 00

Drucktechnische Spezifikationen

- > Die kombinierten Warnhinweise sind ohne Änderung der Proportionen oder Farben zu reproduzieren.
- > Die kombinierten Warnhinweise sind als ein Ganzes zu betrachten und dürfen nicht verändert werden.
- > Mindestanforderung für den Druck: Vierfarbdruck CMYK/133 Linien pro Inch.

Die Fotografien, Abbildungen und Textillustrationen auf dieser CD wurden zur Verwendung auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen gemäß > der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2001 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen (2001/37/EG) > der Entscheidung der Kommission vom 5. September 2003 über die Verwendung von Farbfotografien oder anderen Abbildungen als gesundheitsbezogene Warnhinweise auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen (2003/641/EG) > der Entscheidung der Kommission vom 26. Mai 2005 über die Bibliothek ausgewählter Quelldokumente mit Farbfotografien und anderen Abbildungen für die einzelnen in Anhang 1 der Richtlinie 2001/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates enthaltene ergänzenden Warnhinweise (K(2005) 1452 endg.) entwickelt.

Alle sonstigen Verwendungszwecke bedürfen der Genehmigung durch die Europäische Kommission.