

The photographs, images and textual illustrations contained in this document have been developed for use on tobacco product packages in accordance with the Commission Decision of 5 September 2003 on the use of colour photographs or other illustrations as health warnings on tobacco packages (2003/641/EC).

All other uses are subject to the permission of the European Commission.

Les photographies, images et commentaires écrits apparaissant dans ce Document ont été créés pour figurer sur les emballages de produits du tabac, conformément à la décision de la Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac (2003/641/CE).

Tout autre utilisation est soumise à l'autorisation préalable de la Commission européenne.

Die Fotografien, Abbildungen und Textillustrationen in diesem Dokument wurden zur Verwendung auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen gemäß der Kommissionsentscheidung vom 5. September 2003 über die Verwendung von Farbfotografien und anderen Abbildungen als gesundheitsbezogene Warnhinweise auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen (2003/0641) entwickelt.

Alle sonstigen Verwendungszwecke bedürfen der Genehmigung durch die Europäische Kommission.

LIITE I

Valikoitujen lähdeasiakirjojen arkisto

Tupakoivat kuolevat nuorempina.

Elinikäiset tupakoitsijat menettävät keskimäärin noin 14 vuotta elämästään
Tupakoivat kuolevat nuorempina

De som röker hela livet går miste om i genomsnitt 14 års livstid
Rökare dör i förtid



Tupakoivat kuolevat nuorempina
Rökare dör i förtid



Tupakoivat kuolevat nuorempina
Rökare dör i förtid

Tupakointi tukkii verisuonet sekä aiheuttaa sydänkohtauksia ja aivoveritulppia.

Tupakoitsijoiden halvausriski on noin 50 % korkeampi kuin ei-tupakoitsijoiden
Tupakointi tukkii verisuonet sekä aiheuttaa sydänkohtauksia ja aivoveritulppia

Risken för att få en stroke är ungefär 50 % högre för rökare än för icke rökare
Rökning ger förträngningar i blodkärlen och orsakar hjärtinfarkt och stroke



Tupakointi tukkii verisuonet sekä aiheuttaa sydänkohtauksia ja aivoveritulppia
Rökning ger förträngningar i blodkärlen och orsakar hjärtinfarkt och stroke



Tupakointi tukkii verisuonet sekä aiheuttaa sydänkohtauksia ja aivoveritulppia
Rökning ger förträngningar i blodkärlen och orsakar hjärtinfarkt och stroke

Tupakointi aiheuttaa keuhkosityöpää, joka johtaa kuolemaan.



Tupakointi aiheuttaa keuhkosityöpää, joka johtaa kuolemaan
Rökning orsakar dödlig lungcancer



Tupakointi aiheuttaa keuhkosityöpää, joka johtaa kuolemaan
Rökning orsakar dödlig lungcancer



Tupakointi aiheuttaa keuhkosityöpää, joka johtaa kuolemaan
Rökning orsakar dödlig lungcancer

Tupakointi aiheuttaa voimakasta riippuvuutta. Älä aloita.



Lopettamalla tupakoinnin vähennät vaaraa sairastua kuolemaan johtaviin sydän- ja keuhkosairauksiin.



Tupakointi voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman.



Tupakointi vanhentaa ihoa.



Tupakointi voi vahingoittaa siittiöitä ja vähentää hedelmällisyyttä.



Tupakointi aiheuttaa impotenssia ja voi heikentää verenkiertoa.



Savu sisältää bentseeniä, nitrosamiineja, formaldehydiä ja vetysyanidia.




Tupakointi raskauden aikana vahingoittaa lastasi.



Suojele lapsia: älä pakota heitä hengittämään tupakansavua.



Lääkäriltä tai apteekista saat apua tupakoinnin lopettamiseen.



Pyydä apua tupakoinnin lopettamiseen.



Kutakin jäsenvaltiota koskeva kuva-arkisto:
http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/ev_20041022_en.htm

LIITE II

Painatusta koskevat tekniset erittelyt

Yhdistelmävaroitukset on tuotettava muuttamatta mitenkään niiden mittasuhteita tai värejä.

Yhdistelmävaroitukset on laadittu kokonaisiksi kuviksi, eikä niitä saa muuttaa.

Yhdistelmävaroitusten painatuksessa vähimmäisvaatimus: neliväri, CMYK, linjatiheys 133 lpi (lines per inch).