

The photographs, images and textual illustrations contained in this document have been developed for use on tobacco product packages in accordance with the Commission Decision of 5 September 2003 on the use of colour photographs or other illustrations as health warnings on tobacco packages (2003/641/EC).

All other uses are subject to the permission of the European Commission.

Les photographies, images et commentaires écrits apparaissant dans ce Document ont été créés pour figurer sur les emballages de produits du tabac, conformément à la décision de la Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac (2003/641/CE).

Tout autre utilisation est soumise à l'autorisation préalable de la Commission européenne.

Die Fotografien, Abbildungen und Textillustrationen in diesem Dokument wurden zur Verwendung auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen gemäß der Kommissionsentscheidung vom 5. September 2003 über die Verwendung von Farbfotografien und anderen Abbildungen als gesundheitsbezogene Warnhinweise auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen (2003/0641) entwickelt.

Alle sonstigen Verwendungszwecke bedürfen der Genehmigung durch die Europäische Kommission.

## ANNEXE I

### Bibliothèque électronique des documents source sélectionnés


#### Les fumeurs meurent prématurément



#### Fumer bouche les artères et provoque des crises cardiaques et des attaques cérébrales




#### Fumer provoque le cancer mortel du poumon



#### Fumer crée une forte dépendance, ne commencez pas



## Arrêter de fumer réduit les risques de maladies cardiaques et pulmonaires mortelles



## Fumer peut entraîner une mort lente et douloureuse




## Fumer provoque un vieillissement de la peau



## Fumer peut nuire aux spermatozoïdes et réduit la fertilité



Fumer peut diminuer l'afflux sanguin et provoque l'impuissance



La fumée contient du benzène, des nitrosamines, du formaldéhyde et du cyanure d'hydrogène



Fumer pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant



Protégez les enfants : ne leur faites pas respirer votre fumée



Votre médecin ou votre pharmacien peuvent vous aider à arrêter de fumer



Faites-vous aider pour arrêter de fumer



Pour plus de détails, chaque état membre peut consulter le site suivant:  
[http://europa.eu.int/comm/health/ph\\_determinants/life\\_style/Tobacco/ev\\_20041022\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/ev_20041022_en.htm)

## **ANNEXE II**

### **Spécifications techniques pour l'impression**

Les avertissements combinés sont reproduits sans aucune modification des proportions ou des couleurs.

Les avertissements combinés sont conçus comme des images à prendre dans leur ensemble et ne peuvent être modifiés.

Les avertissements combinés sont imprimés au minimum en quadrichromie (CMYK), linéature 133.