



Kombinirana opozorila

Kadilci umirajo mlajši

Kadilci, ki kadijo vse življenje, v povprečju izgubijo 14 let življenja

Kadilci umirajo mlajši

Kadilci umirajo mlajši

Kadilci umirajo mlajši

Kajenje maši žile in povzroča srčni infarkt in možgansko kap

Pri kadilcih je tveganje kapi za približno 50% večje kot pri nekadilcih

Kajenje maši žile in povzroča srčni infarkt in možgansko kap

Kajenje maši žile in povzroča srčni infarkt in možgansko kap

Kajenje maši žile in povzroča srčni infarkt in možgansko kap

Kajenje povzroča smrt zaradi pljučnega raka

Kajenje povzroča smrt zaradi pljučnega raka

Kajenje povzroča smrt zaradi pljučnega raka

Kajenje povzroča smrt zaradi pljučnega raka

Kajenje povzroča hudo zasvojenost, zato ne začnite kaditi

Kajenje povzroča hudo zasvojenost, zato ne začnite kaditi

Kajenje povzroča hudo zasvojenost, zato ne začnite kaditi

Kajenje povzroča hudo zasvojenost, zato ne začnite kaditi

Opustitev kajenja zmanjša tveganje za smrt zaradi bolezni srca in pljuč

Po 1 letu abstiniranja se tveganje za koronarna srčna obolenja zaradi kajenja zmanjša za 50%

Opustitev kajenja zmanjša tveganje za smrt zaradi bolezni srca in pljuč

Opustitev kajenja zmanjša tveganje za smrt zaradi bolezni srca in pljuč

Opustitev kajenja zmanjša tveganje za smrt zaradi bolezni srca in pljuč

Kajenje lahko povzroči počasno in boleče umiranje

Kajenje lahko povzroči počasno in boleče umiranje

Kajenje lahko povzroči počasno in boleče umiranje

Kajenje lahko povzroči počasno in boleče umiranje

Kajenje povzroča staranje kože

Kajenje povzroča staranje kože

Kajenje povzroča staranje kože

Kajenje povzroča staranje kože

Kajenje lahko škoduje spermi in zmanjša plodnost

Kajenje lahko škoduje spermi in zmanjša plodnost

Kajenje lahko škoduje spermi in zmanjša plodnost

Kajenje lahko škoduje spermi in zmanjša plodnost

Kajenje lahko zmanjša pretok krvi in povzroči impotenco

Kajenje lahko zmanjša pretok krvi in povzroči impotenco

Kajenje lahko zmanjša pretok krvi in povzroči impotenco

Kajenje lahko zmanjša pretok krvi in povzroči impotenco

Cigaretetni dim vsebuje benzen, nitrosamine, formaldehid in vodikov cianid

Cigaretetni dim vsebuje benzen, nitrosamine, formaldehid in vodikov cianid

Cigaretetni dim vsebuje benzen, nitrosamine, formaldehid in vodikov cianid

Cigaretetni dim vsebuje benzen, nitrosamine, formaldehid in vodikov cianid

Kajenje med nosečnostjo škoduje vašemu otroku

Kajenje med nosečnostjo škoduje vašemu otroku

Kajenje med nosečnostjo škoduje vašemu otroku

Kajenje med nosečnostjo škoduje vašemu otroku

Varujte otroke pred vdihavanjem vašega cigaretne dima

Varujte otroke pred vdihavanjem vašega cigaretne dima

Varujte otroke pred vdihavanjem vašega cigaretne dima

Varujte otroke pred vdihavanjem vašega cigaretne dima

Vaš zdravnik ali farmacevt vam lahko pomaga opustiti kajenje

To lahko premagate, pomagali vam bomo

Vaš zdravnik ali farmacevt vam lahko pomaga opustiti kajenje

Kajenje pomeni hudo zasvojenost z nikotinom; naj vam ne bo nerodno reči za pomoč

Vaš zdravnik ali farmacevt vam lahko pomaga opustiti kajenje

Vaš zdravnik ali farmacevt vam lahko pomaga opustiti kajenje

Poiščite pomoč pri opuščanju kajenja

0803 00 00 00

Izberite svobodo, pomagali vamo bomo

Poiščite pomoč pri opuščanju kajenja

Poiščite pomoč pri opuščanju kajenja: 0803 00 00 00

Poiščite pomoč pri opuščanju kajenja: 0803 00 00 00

Tehnične specifikacije za tiskanje

- > Kombinirana opozorila morajo biti natisnjena brez vsakih sprememb njihovih dimenzij ali barv.
- > Kombinirana opozorila so zasnovana kot celota in se ne smejo spreminjati.
- > Kombinirana opozorila morajo biti natisnjena najmanj štiribarvno /-CMYK-/: 133 črt na palec.

Fotografije, slike in besedilne ilustracije na tem CD-ju so bile izdelane za uporabo na embalaži tobaknih izdelkov v skladu z:

- > Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobaknih izdelkov (2001/37/ES)
- > Odločbo Komisije z dne 5. septembra 2003 o uporabi barvnih fotografij ali drugih ilustracij kot zdravstvenih opozoril na zunanji embalaži tobaknih izdelkov (2003/641/ES)
- > Odločbo Komisije z dne 26. maja 2005 o knjižnici izbranih izvornih dokumentov, ki vsebujejo barvne fotografije ali druge ilustracije za vsako od dodatnih opozoril, ki so navedena v Prilogi 1 k Direktivi 2001/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta (K(2005) 1452 končni)

Za vse druge uporabe je treba pridobiti dovoljenje Evropske komisije.