

# Borstkanker Kort en bondig

# Meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Ook is het onder vrouwen van 30 tot 59 jaar een van de belangrijkste doodsoorzaken. Het aantal nieuwe gevallen dat zich jaarlijks voordoet en de sterfte zijn in Nederland hoog, ook internationaal gezien. In 1998 is het aantal vrouwen met borstkanker geschat op 91.600. In 1997 was het aantal nieuwe patiënten 9.993. Van hen had 7-9% al kanker in de andere borst gehad. In 2000 overleden 3.425 vrouwen aan borstkanker.

### Aantal nieuwe gevallen neemt niet verder toe

In de periode 1972-1994 is het aantal nieuwe gevallen van borstkanker geleidelijk gestegen. Tussen 1994 en 1997 bleef het aantal nieuwe patiënten vrijwel constant (ongeveer 10.000 per jaar). De sterfte aan borstkanker lijkt na 1994 iets af te nemen.

## Daling sterfte door screening, betere diagnostiek en behandeling

De toename tot 1994 van het aantal nieuwe gevallen van borstkanker is onder meer veroorzaakt door de invoering van het bevolkingsonderzoek. Hierdoor komen meer gevallen aan het licht. Doordat een groot deel van de langzaam groeiende tumoren in de eerste ronde van het bevolkingsonderzoek is ontdekt, heeft het aantal nieuwe gevallen zich na 1994 gestabiliseerd. Wel staan daarnaast meer vrouwen bloot aan de volgende risicofactoren: eerste menstruatie bij jongere leeftijd, geboorte van het eerste kind bij latere leeftijd, afnemend kindertal, toename in het gebruik van orale anticonceptie. Andere risicofactoren zijn alcoholconsumptie, lichamelijke inactiviteit bij jongere vrouwen en ernstig overgewicht. Geschat wordt dat 30-50% van alle nieuwe gevallen van borstkanker kan worden toegeschreven aan deze risicofactoren. Dat de sterfte sinds 1979 niet toeneemt en sinds 1994 iets daalt, is te danken aan betere voorlichting over vroege symptomen en aan verbeteringen in diagnostiek en behandeling.

#### Stijging borstkanker verwacht door toename risicofactoren

Nu de screening op borstkanker volledig is ingevoerd (in 1997), zal het aantal nieuwe gevallen van borstkanker dat hierdoor ontdekt wordt dalen. Dat meer vrouwen te maken krijgen met de genoemde risicofactoren die samenhangen met de voortplanting, zal echter een ongunstig effect hebben op het aantal nieuwe gevallen van borstkanker. Het 'netto'-effect van deze ontwikkelingen is moeilijk te voorspellen. Op basis van alleen demografische ontwikkelingen is de verwachting dat het absolute aantal vrouwen bij wie borstkanker wordt geconstateerd in de periode 2000-2020 zal toenemen met circa 25%.


Voogd AC (UM). Borstkanker samengevat. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM,

🚰 Borstkanker: Zijn er internationale verschillen? - Nationaal Kompas Volksgezondheid -	Microsoft Internet Explorer
Evample of document (Breast cancer) Back Forward Stop Refresh Home Search Favorites History Mail Print Edit	
Zijn er internationale verschi Are there international differences?	
▶ Incidentie ▶ Sterfte	Clickable Source link
Incidentie Nederlandse incidentie van borstkanker hoogst in de EU Wat betreft de incidentie van borstkanker is Nederland koploper van de EU ( <i>zie</i>	Figuur 1: Incidentie van borstkanker bij vrouwen in een aantal Europese landen in 1995; gestandaardiseerd naar de Europese bevolking (Bron: EUCAN, 1999).
<i>figuur 1</i> ). Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in de westerse wereld. De precieze oorzaak van deze relatief hoge incidentie is niet bekend. Wel is het zo dat een aantal risicofactoren voor het krijgen van borstkanker in Nederland veel voorkomen vergeleken met andere Europese landen.	Denemarken Finland Zweden
Oudere moeders, weinig borstvoeding Het op oudere leeftijd krijgen van het eerste kind wordt in verband gebracht met een verhoogde kans op borstkanker. Sinds 1980 behoort Nederland tot de landen waar vouwen op relatief hoge leeftijd hun eerste kind krijgen. Op dit moment voert Nederland hiermee de lijst van Europese landen aan met een gemiddelde leeftijd van 29,1 jaar (Council of Europe, 2000). Verder wordt aan het ge en van borstvoeding een beschermende werking toegekend in relatie met borstkank . In vergelijking met de rest van Europa scoort Nederland ere verder wordt aan het ge en van borstvoeding een beschermende werking toegekend in vergelijking met de rest van Europa scoort Nederland ere verder wordt aan het ge en van borstvoeding een beschermende werking toegekend in vergelijking met de rest van Europa scoort Nederland ere verder wordt aan het ge en van borstvoeding een beschermende werking toegekend in vergelijking met de rest van Europa scoort Nederland ere verder verder verder en van de in europa gevonden verschillen. In de Scandinavische landen is de incidentie van borstkanker namelijk ook relatief hoog.	Frankrijk   België   Luxemburg   lerland   Verenigd Koninkrijk   EU 15   Duitsland   Italië   Oostenrijk   Fortugal   Griekenland   Spanje   0 20 40 60 80 100 120
	incidentie (per 100.000)

ē

🜆 Local intranet

-



ef

# Incidentie

# Nederlandse incidentie van borstkanker hoogst in de EU

Wat betreft de incidentie van borstkanker is Nederland koploper van de EU (*zie figuur 1*). Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in de westerse wereld. De precieze oorzaak van deze relatief hoge incidentie is niet bekend. Wel is het zo dat een aantal risicofactoren voor het krijgen van borstkanker in Nederland veel voorkomen vergeleken met andere Europese landen.


# Oudere moeders, weinig borstvoeding


Het op oudere leeftijd krijgen van het eerste kind wordt in verband gebracht met een verhoogde kans op borstkanker. Sinds 1980 behoort Nederland tot de landen waar vrouwen op relatief hoge leeftijd hun eerste kind krijgen. Op dit moment voert Nederland hiermee de lijst van Europese landen aan met een gemiddelde leeftijd van 29,1 jaar (Council of Europe, 2000).

Verder wordt aan het geven van borstvoeding een beschermende werking toegekend in relatie met borstkanker. In vergelijking met de rest van Europa scoort Nederland erg laag met het geven van borstvoeding. Met name in de Scandinavische landen wordt meer en langer de borst gegeven. In Zweden krijgt ongeveer 80% van de

baby's b Dit verk In de S hoog.

Result of reference-hyperlink Click further for complete list of references Figuur 1: Incidentie van borstkanker bij vrouwen in een aantal Europese landen in 1995; gestandaardiseerd naar de Europese bevolking (Bron: EUCAN, 1999).





This paper was produced for a meeting organized by Health & Consumer Protection DG and represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof.