

BILAGA

**BILAGA III
MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL**

B. BIPACKSEDEL

LÄKEMEDLETS NAMN

ZYPREXA 2.5 mg TABLETTER (OLANZAPIN)

ALLMÄNNA RÅD

Läs denna användarinformation noggrant innan du använder medicinen. Den innehåller viktig information om Din medicin. Om du efter att ha läst informationen har frågor kontakta då Din läkare eller fråga på apoteket. Behåll detta informationsblad till dess medicinen tar slut eftersom Du kanske behöver läsa informationen igen. Kom ihåg att medicinen är utskriven för Dig och ge aldrig denna medicin till någon annan.

VAD INNEHÅLLER ZYPREXA?

ZYPREXA tabletter innehåller som aktiv beståndsdel 2.5 mg olanzapin.

Tabletterna innehåller också följande inaktiva substanser: laktosmonohydrat, hydroxipropylcellulosa, kros повідon, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, metylhydroxipropylcellulosa, titandioxid (E 171), makrogol, karnaubavax, polysorbat 80 och indigokarmin (E 132).

LÄKEMEDELSFORM

ZYPREXA 2.5 mg dragerade tabletter är vita.

De finns förpackade i kartong innehållande 28 tabletter.

TYP AV LÄKEMEDEL

ZYPREXA tillhör läkemedelsgruppen neuroleptika.

INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND OCH TILLVERKARE

Eli Lilly Nederland BV, Krijtwal 17-23, 3432 ZT, Nieuwegein, Holland

Tillverkare: Eli Lilly and Company ,Kingsclere Road, Basingstoke, England

VAD ANVÄNDS ZYPREXA FÖR?

ZYPREXA används för att behandla symtom som att höra, se eller förnimma något som inte finns, vanföreställningar, ovanlig misstänksamhet och tillbakadragenhet. Personer med dessa tillstånd kan också känna sig deprimerade, ängsliga eller spända.

NÄR SKALL ZYPREXA INTE ANVÄNDAS?

Om du haft en allergisk reaktion mot ZYPREXA eller någon beståndsdel i tabletten, som finns upptagen under rubriken "Vad finns i ZYPREXA", skall Du inte ta ZYPREXA. En allergisk reaktion kan yttra sig som hudutslag, klåda, uppsvullet ansikte eller svullna

läppar eller svårighet att andas. Kontakta då Din läkare. Du skall inte ta ZYPREXA om Du tidigare har haft glaukom med trång kammarvinkel.

FÖRSIKTIGHET VID ANVÄNDNING

Läkemedel av denna typ kan orsaka onormala rörelser i ansikte eller tunga. Kontakta Din läkare om detta inträffar.

Denna typ av läkemedel kan också orsaka feber, andfåddhet, svettning, muskelstelhet och dåsighet. Dessa biverkningar förekommer ytterst sällan men om de inträffar sluta med medicinen och kontakta omgående Din läkare.

Det är viktigt att Du talar om för Din läkare om Du lider av någon av följande sjukdomar:

- Σ Lever- eller njursjukdom
- Σ Parkinsons sjukdom
- Σ Epilepsi
- Σ Prostataproblem
- Σ Tarmvred (paralytisk ileus)
- Σ Blodsjukdom

Är Du över 65 år bör blodtrycket kontrolleras regelbundet av Din doktor.

INTERAKTIONER

Tala alltid om för Din läkare om Du tar någon annan medicin eftersom vissa mediciner som tages tillsammans kan orsaka skada. Tillsammans med följande mediciner kan dåsighet uppkomma: medel mot ångest, sömnmedel (lugnande medel) och medel mot depression. Ta endast sådana mediciner under ZYPREXA-behandlingen om Din läkare tillråder detta.

Tar Du mediciner för Parkinsons sjukdom skall Din läkare informeras om detta, innan Du intar ZYPREXA.

Alkohol: Drick ej alkohol under behandling med ZYPREXA eftersom ZYPREXA tillsammans med alkohol kan orsaka dåsighet.

VARNINGAR

Graviditet och amning: Tala om för Din läkare om Du är gravid eller tror att Du kan vara gravid eller planerar att bli gravid. Tag inte denna medicin om Du är gravid utan att tillfråga Din läkare. Tag inte denna medicin om Du ammar.

Bilkörning och hantering av maskiner: Det finns risk för att Du känner Dig dåsig när Du börjar ta ZYPREXA. Om detta inträffar kör ej bil eller arbeta med maskiner och rådgör med Din läkare om detta.

ZYPREXA innehåller laktos vilket bör uppmärksammas av dem som är intoleranta mot laktos.

HUR ZYPREXA SKALL INTAS

Dosen och behandlingstiden bestäms av Din läkare som anpassar dem individuellt för Dig. Läs noga informationen på etiketten.

Dosen av ZYPREXA är 5-20 mg per dag och skall intas en gång om dagen. Försök ta ZYPREXA vid samma tidpunkt varje dag antingen vid måltid eller mellan måltid. Tablettarna skall sväljas hela med vatten.

Det är viktigt att Du följer Din läkares anvisningar och ej slutar att ta medicinen för att Du känner Dig bättre.

ZYPREXA tabletter får inte intas av patienter som är under 18 år.

Glömd tablett: Om Du har glömt att ta medicinen, tag den så snart Du kommer ihåg. Ta inte två doser samma dag.

Överdoseriing: Om du fått i Dig för stor mängd tabletter kontakta alltid Din läkare eller sjukhus omedelbart. Ta med Dig återstående tabletter.

INFORMATION OM TÄNKBARA BIVERKNINGAR

ZYPREXA kan ge biverkningar såsom sömnhet, viktökning, yrsel, ökad aptit, vätskeansamling, förstoppning, muntorrhet, oro, onormala rörelser, darrningar och stelhet. I början av behandlingen kan vissa personer känna yrsel särskilt när de reser sig från liggande eller sittande ställning. Detta försvinner ofta av sig själv. Om så ej är fallet kontakta Din läkare.

I sällsynta fall kan ZYPREXA ge upphov till känslighet för starkt solljus.

Efter långvarigt bruk kan vissa kvinnor få mjölksekretion från bröstet eller utebliven eller oregelbunden menstruation. Om detta är bestående tala med Din läkare.

Om Du får biverkningar rådgör alltid med Din läkare eller apoteket.

HÅLLBARHET

Använd ZYPREXA tabletter före utgångsdatum som finns på förpackningen.

FÖRVARING

ZYPREXA tabletter är ljuskänsliga och skall förvaras i sin förpackning i rumstemperatur på ett torrt ställe i skydd för direkt solljus.

Medicin som inte förbrukas bör lämnas till apoteket för förstöring.

LÄKEMEDEL SKALL FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

DATUM FÖR DEN SENASTE REVISIONEN AV BIPACKSEDELN

Information om detta läkemedel lämnas av den lokala representanten för innehavaren av försäljningstillståndet.

Belgique/België/Belgien: Eli Lilly Benelux S.A., Rue de l'Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) 548 84 84.

Danmark: Eli Lilly Danmark A/S, Thoravej 4, 2400 København NV. Tlf: 38 16 86 00.

Deutschland: Lilly Deutschland GmbH, Niederlassung in 61343 Bad Homburg. Tel: 06172 273 426 Fax: 06172 273 230

Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε, 15^ο χλμ Εθνικ_ς Οδου Αθην_ν-Λαμίας, Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά. Τηλ.: 6294600.

España: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, Polígono Industrial de Alcobendas, Alcobendas, 28100 Madrid. Tel: (91) 663 50 00.

France: Lilly France S.A., 203 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud. Tel: (01) 49 11 34 34

Ireland: Eli Lilly & Company (Ireland) Ltd, 44 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Republic of Ireland. Tel: 353 1 6614377

Italia: Eli Lilly Italia SpA, Via Gramsci 731/733, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel: (0)55 42571

Luxembourg: Eli Lilly Benelux S.A., Rue de l'Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) 548 84 84.

Nederland: Eli Lilly Nederland B.V., Krijtwal 17-23, 3432 ZT, Nieuwegein, Nederland. Tel: 30 60 25 800

Österreich: Eli Lilly Ges. m.b.H., Barichgasse 40-42, A-1030 Wien. Tel: (1) 711 78-0.

Portugal: Lilly Farma Produtos Farmacêuticos, Lda, Rua Dr. António Loureiro Borges, 4- Piso 3, Arquiparque- Miraflores, 1495 Algés. Tel: (01) 412 6600

Suomi/Finland: Oy Eli Lilly Finland Ab, PL 16, 01641 Vantaa. Puh: (09)-85 45 250. Box 16, 01641 Vanda. Tel: (09)-85 45 250.

Sverige: Eli Lilly Sweden AB, Box 30037, 10425 Stockholm. Tel: (08) 6199450.

United Kingdom: Eli Lilly & Company Ltd., Dextra Court, Chapel Hill, Basingstoke, Hampshire, RG21 5SY. Tel: (0)1256 315000

LÄKEMEDLETS NAMN

ZYPREXA 5 mg TABLETTER (OLANZAPIN)

ALLMÄNNA RÅD

Läs denna användarinformation noggrant innan du använder medicinen. Den innehåller viktig information om Din medicin. Om du efter att ha läst informationen har frågor kontakta då Din läkare eller fråga på apoteket. Behåll detta informationsblad till dess medicinen tar slut eftersom Du kanske behöver läsa informationen igen. Kom ihåg att medicinen är utskrivna för Dig och ge aldrig denna medicin till någon annan.

VAD INNEHÅLLER ZYPREXA?

ZYPREXA tabletter innehåller som aktiv beståndsdel 5 mg olanzapin. Tabletterna innehåller också följande inaktiva substanser: laktosmonohydrat, hydroxipropylcellulosa, kros повідon, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, metylhydroxipropylcellulosa, titandioxid (E 171), makrogol, karnaubavax, polysorbat 80 och indigokarmin (E 132).

LÄKEMEDELSFORM

ZYPREXA 5 mg dragerade tabletter är vita.
De finns förpackade i kartong innehållande 28 tabletter.

TYP AV LÄKEMEDEL

ZYPREXA tillhör läkemedelsgruppen neuroleptika.

INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND OCH TILLVERKARE

Eli Lilly Nederland BV, Krijtwal 17-23, 3432 ZT, Nieuwegein, Holland
Tillverkare: Eli Lilly and Company, Kingsclere Road, Basingstoke, England

VAD ANVÄNDS ZYPREXA FÖR?

ZYPREXA används för att behandla symtom som att höra, se eller förnimma något som inte finns, vanföreställningar, ovanlig misstänksamhet och tillbakadragenhet. Personer med dessa tillstånd kan också känna sig deprimerade, ängsliga eller spända.

NÄR SKALL ZYPREXA INTE ANVÄNDAS?

Om du haft en allergisk reaktion mot ZYPREXA eller någon beståndsdel i tabletten, som finns upptagen under rubriken "Vad finns i ZYPREXA", skall Du inte ta ZYPREXA. En allergisk reaktion kan yttra sig som hudutslag, klåda, uppsvullet ansikte eller svullna

läppar eller svårighet att andas. Kontakta då Din läkare. Du skall inte ta ZYPREXA om Du tidigare har haft glaukom med trång kammarvinkel.

FÖRSIKTIGHET VID ANVÄNDNING

Läkemedel av denna typ kan orsaka onormala rörelser i ansikte eller tunga. Kontakta Din läkare om detta inträffar.

Denna typ av läkemedel kan också orsaka feber, andfåddhet, svettning, muskelstelhet och dåsighet. Dessa biverkningar förekommer ytterst sällan men om de inträffar sluta med medicinen och kontakta omgående Din läkare.

Det är viktigt att Du talar om för Din läkare om Du lider av någon av följande sjukdomar:

- Σ Lever- eller njursjukdom
- Σ Parkinsons sjukdom
- Σ Epilepsi
- Σ Prostataproblem
- Σ Tarmvred (paralytisk ileus)
- Σ Blodsjukdom

Är Du över 65 år bör blodtrycket kontrolleras regelbundet av Din doktor.

INTERAKTIONER

Tala alltid om för Din läkare om Du tar någon annan medicin eftersom vissa mediciner som tas tillsammans kan orsaka skada. Tillsammans med följande mediciner kan dåsighet uppkomma: medel mot ångest, sömnmedel (lugnande medel) och medel mot depression. Ta endast sådana mediciner under ZYPREXA-behandlingen om Din läkare tillråder detta.

Tar Du mediciner för Parkinsons sjukdom skall Din läkare informeras om detta, innan Du intar ZYPREXA.

Alkohol: Drick ej alkohol under behandling med ZYPREXA eftersom ZYPREXA tillsammans med alkohol kan orsaka dåsighet.

VARNINGAR

Graviditet och amning: Tala om för Din läkare om Du är gravid eller tror att Du kan vara gravid eller planerar att bli gravid. Tag inte denna medicin om Du är gravid utan att tillfråga Din läkare. Tag inte denna medicin om Du ammar.

Bilkörning och hantering av maskiner: Det finns risk för att Du känner Dig dåsig när Du börjar ta ZYPREXA. Om detta inträffar kör ej bil eller arbeta med maskiner och rådgör med Din läkare om detta.

ZYPREXA innehåller laktos vilket bör uppmärksammas av dem som är intoleranta mot laktos.

HUR ZYPREXA SKALL INTAS

Dosen och behandlingstiden bestäms av Din läkare som anpassar dem individuellt för Dig. Läs noga informationen på etiketten.

Dosen av ZYPREXA är 5-20 mg per dag och skall intas en gång om dagen. Försök ta ZYPREXA vid samma tidpunkt varje dag antingen vid måltid eller mellan måltid. Tablettarna skall sväljas hela med vatten.

Det är viktigt att Du följer Din läkares anvisningar och ej slutar att ta medicinen för att Du känner Dig bättre.

ZYPREXA tabletter får inte intas av patienter som är under 18 år.

Glömd tablett: Om Du har glömt att ta medicinen, tag den så snart Du kommer ihåg. Ta inte två doser samma dag.

Överdoser: Om du fått i Dig för stor mängd tabletter kontakta alltid Din läkare eller sjukhus omedelbart. Ta med Dig återstående tabletter.

INFORMATION OM TÄNKBARA BIVERKNINGAR

ZYPREXA kan ge biverkningar såsom sömnhet, viktökning, yrsel, ökad aptit, vätskeansamling, förstoppning, muntorrhet, oro, onormala rörelser, darrningar och stelhet. I början av behandlingen kan vissa personer känna yrsel särskilt när de reser sig från liggande eller sittande ställning. Detta försvinner ofta av sig själv. Om så ej är fallet kontakta Din läkare.

I sällsynta fall kan ZYPREXA ge upphov till känslighet för starkt solljus.

Efter långvarigt bruk kan vissa kvinnor få mjölksekretion från bröstet eller utebliven eller oregelbunden menstruation. Om detta är bestående tala med Din läkare.

Om Du får biverkningar rådgör alltid med Din läkare eller apoteket.

HÅLLBARHET

Använd ZYPREXA tabletter före utgångsdatum som finns på förpackningen.

FÖRVARING

ZYPREXA tabletter är ljuskänsliga och skall förvaras i sin förpackning i rumstemperatur på ett torrt ställe i skydd för direkt solljus.

Medicin som inte förbrukas bör lämnas till apoteket för förstöring.

LÄKEMEDEL SKALL FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

DATUM FÖR DEN SENASTE REVISIONEN AV BIPACKSEDELN

Information om detta läkemedel lämnas av den lokala representanten för innehavaren av försäljningstillståndet.

Belgique/België/Belgien: Eli Lilly Benelux S.A., Rue de l'Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) 548 84 84.

Danmark: Eli Lilly Danmark A/S, Thoravej 4, 2400 København NV. Tlf: 38 16 86 00.

Deutschland: Lilly Deutschland GmbH, Niederlassung in 61343 Bad Homburg. Tel: 06172 273 426 Fax: 06172 273 230

Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε, 15^ο χλμ Εθνικ_ς Οδου Αθην_ν-Λαμίας, Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά. Τηλ.: 6294600.

España: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, Polígono Industrial de Alcobendas, Alcobendas, 28100 Madrid. Tel: (91) 663 50 00.

France: Lilly France S.A., 203 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud. Tel: (01) 49 11 34 34

Ireland: Eli Lilly & Company (Ireland) Ltd, 44 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Republic of Ireland. Tel: 353 1 6614377

Italia: Eli Lilly Italia SpA, Via Gramsci 731/733, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel: (0)55 42571

Luxembourg: Eli Lilly Benelux S.A., Rue de l'Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) 548 84 84.

Nederland: Eli Lilly Nederland B.V., Krijtwal 17-23, 3432 ZT, Nieuwegein, Nederland. Tel: 30 60 25 800

Österreich: Eli Lilly Ges. m.b.H., Barichgasse 40-42, A-1030 Wien. Tel: (1) 711 78-0.

Portugal: Lilly Farma Produtos Farmacêuticos, Lda, Rua Dr. António Loureiro Borges, 4- Piso 3, Arquiparque- Miraflores, 1495 Algés. Tel: (01) 412 6600

Suomi/Finland: Oy Eli Lilly Finland Ab, PL 16, 01641 Vantaa. Puh: (09)-85 45 250. Box 16, 01641 Vanda. Tel: (09)-85 45 250.

Sverige: Eli Lilly Sweden AB, Box 30037, 10425 Stockholm. Tel: (08) 6199450.

United Kingdom: Eli Lilly & Company Ltd., Dextra Court, Chapel Hill, Basingstoke, Hampshire, RG21 5SY. Tel: (0)1256 315000

LÄKEMEDLETS NAMN

ZYPREXA 7.5 mg TABLETTER (OLANZAPIN)

ALLMÄNNA RÅD

Läs denna användarinformation noggrant innan du använder medicinen. Den innehåller viktig information om Din medicin. Om du efter att ha läst informationen har frågor kontakta då Din läkare eller fråga på apoteket. Behåll detta informationsblad till dess medicinen tar slut eftersom Du kanske behöver läsa informationen igen. Kom ihåg att medicinen är utskriven för Dig och ge aldrig denna medicin till någon annan.

VAD INNEHÅLLER ZYPREXA?

ZYPREXA tabletter innehåller som aktiv beståndsdel 7.5 mg olanzapin. Tabletterna innehåller också följande inaktiva substanser: laktosmonohydrat, hydroxipropylcellulosa, kros повідon, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, metylhydroxipropylcellulosa, titandioxid (E 171), makrogol, karnaubavax, polysorbat 80 och indigokarmin (E 132).

LÄKEMEDELSFORM

ZYPREXA 7.5 mg dragerade tabletter är vita.
De finns förpackade i kartong innehållande 56 tabletter.

TYP AV LÄKEMEDEL

ZYPREXA tillhör läkemedelsgruppen neuroleptika.

INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND OCH TILLVERKARE

Eli Lilly Nederland BV, Krijtwal 17-23, 3432, ZT, Nieuwegein, Holland
Tillverkare: Eli Lilly and Company ,Kingsclere Road, Basingstoke, England

VAD ANVÄNDS ZYPREXA FÖR?

ZYPREXA används för att behandla symtom som att höra, se eller förnimma något som inte finns, vanföreställningar, ovanlig misstänksamhet och tillbakadragenhet. Personer med dessa tillstånd kan också känna sig deprimerade, ängsliga eller spända.

NÄR SKALL ZYPREXA INTE ANVÄNDAS?

Om du haft en allergisk reaktion mot ZYPREXA eller någon beståndsdel i tabletten, som finns upptagen under rubriken "Vad finns i ZYPREXA", skall Du inte ta ZYPREXA. En allergisk reaktion kan yttra sig som hudutslag, klåda, uppsvullet ansikte eller svullna

läppar eller svårighet att andas. Kontakta då Din läkare. Du skall inte ta ZYPREXA om Du tidigare har haft glaukom med trång kammarvinkel.

FÖRSIKTIGHET VID ANVÄNDNING

Läkemedel av denna typ kan orsaka onormala rörelser i ansikte eller tunga. Kontakta Din läkare om detta inträffar.

Denna typ av läkemedel kan också orsaka feber, andfåddhet, svettning, muskelstelhet och dåsighet. Dessa biverkningar förekommer ytterst sällan men om de inträffar sluta med medicinen och kontakta omgående Din läkare.

Det är viktigt att Du talar om för Din läkare om Du lider av någon av följande sjukdomar:

- Σ Lever- eller njursjukdom
- Σ Parkinsons sjukdom
- Σ Epilepsi
- Σ Prostataproblem
- Σ Tarmvred (paralytisk ileus)
- Σ Blodsjukdom

Är Du över 65 år bör blodtrycket kontrolleras regelbundet av Din doktor.

INTERAKTIONER

Tala alltid om för Din läkare om Du tar någon annan medicin eftersom vissa mediciner som tas tillsammans kan orsaka skada. Tillsammans med följande mediciner kan dåsighet uppkomma: medel mot ångest, sömnmedel (lugnande medel) och medel mot depression. Ta endast sådana mediciner under ZYPREXA-behandlingen om Din läkare tillråder detta.

Tar Du mediciner för Parkinsons sjukdom skall Din läkare informeras om detta, innan Du intar ZYPREXA.

Alkohol: Drick ej alkohol under behandling med ZYPREXA eftersom ZYPREXA tillsammans med alkohol kan orsaka dåsighet.

VARNINGAR

Graviditet och amning: Tala om för Din läkare om Du är gravid eller tror att Du kan vara gravid eller planerar att bli gravid. Tag inte denna medicin om Du är gravid utan att tillfråga Din läkare. Tag inte denna medicin om Du ammar.

Bilkörning och hantering av maskiner: Det finns risk för att Du känner Dig dåsig när Du börjar ta ZYPREXA. Om detta inträffar kör ej bil eller arbeta med maskiner och rådgör med Din läkare om detta.

ZYPREXA innehåller laktos vilket bör uppmärksammas av dem som är intoleranta mot laktos.

HUR ZYPREXA SKALL INTAS

Dosen och behandlingstiden bestäms av Din läkare som anpassar dem individuellt för Dig. Läs noga informationen på etiketten.

Dosen av ZYPREXA är 5-20 mg per dag och skall intas en gång om dagen. Försök ta ZYPREXA vid samma tidpunkt varje dag antingen vid måltid eller mellan måltid. Tabletterna skall sväljas hela med vatten.

Det är viktigt att Du följer Din läkares anvisningar och ej slutar att ta medicinen för att Du känner Dig bättre.

ZYPREXA tabletter får inte intas av patienter som är under 18 år.

Glömd tablett: Om Du har glömt att ta medicinen, tag den så snart Du kommer ihåg. Ta inte två doser samma dag.

Överdoseri ng: Om du fått i Dig för stor mängd tabletter kontakta alltid Din läkare eller sjukhus omedelbart. Ta med Dig återstående tabletter.

INFORMATION OM TÄNKBARA BIVERKNINGAR

ZYPREXA kan ge biverkningar såsom sömnhet, viktökning, yrsel, ökad aptit, vätskeansamling, förstoppning, muntorrhet, oro, onormala rörelser, darrningar och stelhet. I början av behandlingen kan vissa personer känna yrsel särskilt när de reser sig från liggande eller sittande ställning. Detta försvinner ofta av sig själv. Om så ej är fallet kontakta Din läkare.

I sällsynta fall kan ZYPREXA ge upphov till känslighet för starkt solljus.

Efter långvarigt bruk kan vissa kvinnor få mjölksekretion från bröstet eller utebliven eller oregelbunden menstruation. Om detta är bestående tala med Din läkare.

Om Du får biverkningar rådgör alltid med Din läkare eller apoteket.

HÅLLBARHET

Använd ZYPREXA tabletter före utgångsdatum som finns på förpackningen.

FÖRVARING

ZYPREXA tabletter är ljuskänsliga och skall förvaras i sin förpackning i rumstemperatur på ett torrt ställe i skydd för direkt solljus.

Medicin som inte förbrukas bör lämnas till apoteket för förstöring.

LÄKEMEDEL SKALL FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

DATUM FÖR DEN SENASTE REVISIONEN AV BIPACKSEDELN

Information om detta läkemedel lämnas av den lokala representanten för innehavaren av försäljningstillståndet.

Belgique/België/Belgien: Eli Lilly Benelux S.A., Rue de l'Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) 548 84 84.

Danmark: Eli Lilly Danmark A/S, Thoravej 4, 2400 København NV. Tlf: 38 16 86 00.

Deutschland: Lilly Deutschland GmbH, Niederlassung in 61343 Bad Homburg. Tel: 06172 273 426 Fax: 06172 273 230

Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε, 15⁰ χλμ Εθνικ_ς Οδου Αθην_ν-Λαμίας, Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά. Τηλ.: 6294600.

España: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, Polígono Industrial de Alcobendas, Alcobendas, 28100 Madrid. Tel: (91) 663 50 00.

France: Lilly France S.A., 203 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud. Tel: (01) 49 11 34 34

Ireland: Eli Lilly & Company (Ireland) Ltd, 44 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Republic of Ireland. Tel: 353 1 6614377

Italia: Eli Lilly Italia SpA, Via Gramsci 731/733, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel: (0)55 42571

Luxembourg: Eli Lilly Benelux S.A., Rue de l'Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) 548 84 84.

Nederland: Eli Lilly Nederland B.V., Krijtwal 17-23, 3432 ZT, Nieuwegein, Nederland. Tel: 30 60 25 800

Österreich: Eli Lilly Ges. m.b.H., Barichgasse 40-42, A-1030 Wien. Tel: (1) 711 78-0.

Portugal: Lilly Farma Produtos Farmacêuticos, Lda, Rua Dr. António Loureiro Borges, 4- Piso 3, Arquiparque- Miraflores, 1495 Algés. Tel: (01) 412 6600

Suomi/Finland: Oy Eli Lilly Finland Ab, PL 16, 01641 Vantaa. Puh: (09)-85 45 250. Box 16, 01641 Vanda. Tel: (09)-85 45 250.

Sverige: Eli Lilly Sweden AB, Box 30037, 10425 Stockholm. Tel: (08) 6199450.

United Kingdom: Eli Lilly & Company Ltd., Dextra Court, Chapel Hill, Basingstoke, Hampshire, RG21 5SY. Tel: (0)1256 315000

LÄKEMEDLETS NAMN

ZYPREXA 10 mg TABLETTER (OLANZAPIN)

ALLMÄNNA RÅD

Läs denna användarinformation noggrant innan du använder medicinen. Den innehåller viktig information om Din medicin. Om du efter att ha läst informationen har frågor kontakta då Din läkare eller fråga på apoteket. Behåll detta informationsblad till dess medicinen tar slut eftersom Du kanske behöver läsa informationen igen. Kom ihåg att medicinen är utskriven för Dig och ge aldrig denna medicin till någon annan.

VAD INNEHÅLLER ZYPREXA?

ZYPREXA tabletter innehåller som aktiv beståndsdel 10 mg olanzapin.

Tabletterna innehåller också följande inaktiva substanser: laktosmonohydrat, hydroxipropylcellulosa, krospovidon, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, metylhydroxipropylcellulosa, titandioxid (E 171), makrogol, karnaubavax, polysorbat 80 och indigokarmin (E 132).

LÄKEMEDELSFORM

ZYPREXA 10 mg dragerade tabletter är vita.

De finns förpackade i kartong innehållande 7, 28 eller 56 tabletter.

TYP AV LÄKEMEDEL

ZYPREXA tillhör läkemedelsgruppen neuroleptika.

INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND OCH TILLVERKARE

Eli Lilly Nederland BV, Krijtwal 17-23, 3432 ZT, Nieuwegein, Holland

Tillverkare: Eli Lilly and Company, Kingsclere Rd, Basingstoke, England

VAD ANVÄNDS ZYPREXA FÖR?

ZYPREXA används för att behandla symtom som att höra, se eller förnimma något som inte finns, vanföreställningar, ovanlig misstänksamhet och tillbakadragenhet. Personer med dessa tillstånd kan också känna sig deprimerade, ängsliga eller spända.

NÄR SKALL ZYPREXA INTE ANVÄNDAS?

Om du haft en allergisk reaktion mot ZYPREXA eller någon beståndsdel i tabletten, som finns upptagen under rubriken "Vad finns i Zyprexa", skall Du inte ta ZYPREXA. En

allergisk reaktion kan yttra sig som hudutslag, klåda, uppsvullet ansikte eller svullna läppar eller svårighet att andas. Kontakta då Din läkare. Du skall inte ta Zyprexa om Du tidigare har haft glaukom med trång kammarvinkel.

FÖRSIKTIGHET VID ANVÄNDNING

Läkemedel av denna typ kan orsaka onormala rörelser i ansikte eller tunga. Kontakta Din läkare om detta inträffar.

Denna typ av läkemedel kan också orsaka feber, andfåddhet, svettning, muskelstelhet och dåsighet. Dessa biverkningar förekommer ytterst sällan men om de inträffar sluta med medicinen och kontakta omgående Din läkare.

Det är viktigt att Du talar om för Din läkare om Du lider av någon av följande sjukdomar:

- Σ Lever- eller njursjukdom
- Σ Parkinsons sjukdom
- Σ Epilepsi
- Σ Prostataproblem
- Σ Tarmvred (paralytisk ileus)
- Σ Blodsjukdom

Är Du över 65 år bör blodtrycket kontrolleras regelbundet av Din doktor.

INTERAKTIONER

Tala alltid om för Din läkare om Du tar någon annan medicin eftersom vissa mediciner som tages tillsammans kan orsaka skada. Tillsammans med följande mediciner kan dåsighet uppkomma: medel mot ångest, sömnmedel (lugnande medel) och medel mot depression. Ta endast sådana mediciner under ZYPREXA-behandlingen om Din läkare tillråder detta.

Tar Du mediciner för Parkinsons sjukdom skall Din läkare informeras om detta, innan Du intar ZYPREXA.

Alkohol: Drick ej alkohol under behandling med ZYPREXA eftersom ZYPREXA tillsammans med alkohol kan orsaka dåsighet.

VARNINGAR

Graviditet och amning: Tala om för Din läkare om Du är gravid eller tror att Du kan vara gravid eller planerar att bli gravid. Tag inte denna medicin om Du är gravid utan att tillfråga Din läkare. Tag inte denna medicin om Du ammar.

Bilkörning och hantering av maskiner: Det finns risk för att Du känner Dig dåsig när Du börjar ta ZYPREXA. Om detta inträffar kör ej bil eller arbeta med maskiner och rådgör med Din läkare om detta.

ZYPREXA innehåller laktos vilket bör uppmärksammas av dem som är intoleranta mot laktos.

HUR ZYPREXA SKALL INTAS

Dosen och behandlingstiden bestäms av Din läkare som anpassar dem individuellt för Dig. Läs noga informationen på etiketten.

Dosen av ZYPREXA är 5-20 mg per dag och skall intas en gång om dagen. Försök ta ZYPREXA vid samma tidpunkt varje dag antingen vid måltid eller mellan måltid. Tablettorna skall sväljas hela med vatten.

Det är viktigt att Du följer Din läkares anvisningar och ej slutar att ta medicinen för att Du känner Dig bättre.

ZYPREXA tabletter får inte intas av patienter som är under 18 år.

Glömd tablett: Om Du har glömt att ta medicinen, tag den så snart Du kommer ihåg. Ta inte två doser samma dag.

Överdoser: Om du fått i Dig för stor mängd tabletter kontakta alltid Din läkare eller sjukhus omedelbart. Ta med Dig återstående tabletter.

INFORMATION OM TÄNKBARA BIVERKNINGAR

ZYPREXA kan ge biverkningar såsom sömnhet, viktökning, yrsel, ökad aptit, vätskeansamling, förstoppning, muntorrhet, oro, onormala rörelser, darrningar och stelhet. I början av behandlingen kan vissa personer känna yrsel särskilt när de reser sig från liggande eller sittande ställning. Detta försvinner ofta av sig själv. Om så ej är fallet kontakta Din läkare.

I sällsynta fall kan ZYPREXA ge upphov till känslighet för starkt solljus.

Efter långvarigt bruk kan vissa kvinnor få mjölksekretion från bröstet eller utebliven eller oregelbunden menstruation. Om detta är bestående tala med Din läkare.

Om Du får biverkningar rådgör alltid med Din läkare eller apoteket.

HÅLLBARHET

Använd ZYPREXA tabletter före utgångsdatum som finns på förpackningen.

FÖRVARING

ZYPREXA tabletter är ljuskänsliga och skall förvaras i sin förpackning i rumstemperatur på ett torrt ställe i skydd för direkt solljus.

Medicin som inte förbrukas bör lämnas till apoteket för förstöring.

LÄKEMEDEL SKALL FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

DATUM FÖR DEN SENASTE REVISIONEN AV BIPACKSEDELN

Information om detta läkemedel lämnas av den lokala representanten för innehavaren av försäljningstillståndet.

Belgique/België/Belgien: Eli Lilly Benelux S.A., Rue de l'Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) 548 84 84.

Danmark: Eli Lilly Danmark A/S, Thoravej 4, 2400 København NV. Tlf: 38 16 86 00.

Deutschland: Lilly Deutschland GmbH, Niederlassung in 61343 Bad Homburg. Tel: 06172 273 426 Fax: 06172 273 230

Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε, 15⁰ χλμ Εθνικ_ς Οδου Αθην_ν-Λαμίας, Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά. Τηλ.: 6294600.

España: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, Polígono Industrial de Alcobendas, Alcobendas, 28100 Madrid. Tel: (91) 663 50 00.

France: Lilly France S.A., 203 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud. Tel: (01) 49 11 34 34

Ireland: Eli Lilly & Company (Ireland) Ltd, 44 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Republic of Ireland. Tel: 353 1 6614377

Italia: Eli Lilly Italia SpA, Via Gramsci 731/733, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel: (0)55 42571

Luxembourg: Eli Lilly Benelux S.A., Rue de l'Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) 548 84 84.

Nederland: Eli Lilly Nederland B.V., Krijtwal 17-23, 3432 ZT, Nieuwegein, Nederland. Tel: 30 60 25 800

Österreich: Eli Lilly Ges. m.b.H., Barichgasse 40-42, A-1030 Wien. Tel: (1) 711 78-0.

Portugal: Lilly Farma Produtos Farmacêuticos, Lda, Rua Dr. António Loureiro Borges, 4- Piso 3, Arquiparque- Miraflores, 1495 Algés. Tel: (01) 412 6600

Suomi/Finland: Oy Eli Lilly Finland Ab, PL 16, 01641 Vantaa. Puh: (09)-85 45 250. Box 16, 01641 Vanda. Tel: (09)-85 45 250.

Sverige: Eli Lilly Sweden AB, Box 30037, 10425 Stockholm. Tel: (08) 6199450.

United Kingdom: Eli Lilly & Company Ltd., Dextra Court, Chapel Hill, Basingstoke, Hampshire, RG21 5SY. Tel: (0)1256 315000