

**LISA I**  
**RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE**

## 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Convenia 80 mg/ml pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks koertele ja kassidele

## 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

**Iga 20 ml viaal lüofiliseeritud pulbrit sisaldab:**      **Iga 5 ml viaal lüofiliseeritud pulbrit sisaldab:**

**Toimeained:**

852 mg tsefovetsiini (naatriumsoolana)

**Toimeained:**

340 mg tsefovetsiini (naatriumsoolana)

**Abiained:**

19,17 mg metüülparahüdroksübensoaati (E218)

2,13 mg propüülparahüdroksübensoaati (E216)

**Abiained:**

7,67 mg metüülparahüdroksübensoaati (E218)

0,85 mg propüülparahüdroksübensoaati (E216)

**Iga 15 viaal lahustit sisaldab:**

**Abiained:**

13 mg/ml bensüülalkoholi

10,8 ml süstevett

**Iga 10 viaal lahustit sisaldab:**

**Abiained:**

13 mg/ml bensüülalkoholi

4,45 ml süstevett

Juhendile vastavalt manustamiskõlblikuks muudetud süstelahus sisaldab:

80,0 mg/ml tsefovetsiini (naatriumsoolana)

1,8 mg/ml metüülparahüdroksübensoaati (E218)

0,2 mg/ml propüülparahüdroksübensoaati (E216)

12,3 mg/ml bensüülalkoholi

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

## 3. RAVIMVORM

Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks.

Pulber on valkjat kuni kollast värvi ja diluent (lahusti) on selge värvitu vedelik.

## 4. KLIINILISED ANDMED

### 4.1 Loomaliigid

Koer, kass.

### 4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Kasutada ainult järgnevate pikaajalist ravi vajavate infektsioonide raviks. Convenia antimikroobne toime pärast üht süsti kestab kuni 14 päeva.

Koer:

*Staphylococcus pseudointermedius*'e,  $\beta$ -hemolüütiliste streptokokkide, *Escherichia coli* ja/või *Pasteurella multocida* põhjustatud naha ja pehmete kudede infektsioonide raviks, kaasa arvatud püoderma, haavad ja abstsessid.

*Escherichia coli* ja/või *Proteus* spp põhjustatud kuseteede infektsioonide raviks.

Toetava ravina mehaanilisele või kirurgilisele periodontaalravile *Porphyromonas* spp. ja *Prevotella* spp. põhjustatud igemete ja periodontaalkudede raskete infektsioonide raviks (vt. ka lõik 4.5 „Erihoiatused“).

#### Kass:

*Pasteurella multocida*, *Fusobacterium* spp., *Bacteroides* spp., *Prevotella oralis*’e,  $\beta$ -hemolüütiliste streptokokkide ja/või *Staphylococcus pseudointermedius*’e põhjustatud naha ja pehmete kudede abstsesside ja haavade raviks..

*Escherichia coli* põhjustatud kuseteede infektsioonide raviks.

### **4.3 Vastunäidustused**

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tsefalosporiini või penitsilliini rea antibiootikumise suhtes. Mitte kasutada väikestel herbivooridel (sealhulgas meriseal ja küülikul). Mitte kasutada noorematel kui 8 nädala vanustel koertel ja kassidel.

### **4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta**

Ei ole.

### **4.5 Ettevaatusabinõud**

#### Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Kolmanda põlvkonna tsefalosporiine on mõistlik kasutada selliste kliiniliste seisundite raviks, mille puhul ei ole andnud piisavat tulemust või mille puhul oletatakse ebapiisavat tulemust teiste antimikrobiaalsete ravimitega või esimese põlvkonna tsefalosporiinidega. Preparaadi kasutamine peab põhinema tundlikkustestil ning tuleb arvestada kohalikku ametlikku antimikrobiaalse ravi poliitikat.

Põhitingimus periodontaalhaiguse raviks on mehaaniline ja/või kirurgiline veterinaarne sekkumine.

*Convenia* ohtust raske neerupuudulikkusega loomadele ei ole uuritud.

Püoderma on sageli sekundaarne haigus. Selle tõttu on soovitatav kindlaks teha esmane haigus ja ravida looma vastavalt.

Loomade puhul, kellel on varem esinenud ülitundlikkusreaktsioone tsefovetsiinile, teistele tsefalosporiinidele, penitsilliinidele või teistele ravimitele, peab preparaadi kasutamisel olema ettevaatlik. Allergiliste reaktsioonide ilmnemisel ei tohi tsefovetsiini rohkem manustada ja peab määrama sobiva ravi beeta-laktaamülitundlikkusreaktsiooni kõrvaldamiseks. Rasked ägedad ülitundlikkusreaktsioonid võivad vajada ravi epinefriiniga ja teisi intensiivravi meetodeid, kaasa arvatud hapniku, intravenoosne vedeliku, intravenoosne antihistamiinide, kortikosteroidide manustamine ja hingamisteede kontroll vastavalt kliinilistele nähtudele. Veterinaarid peavad teadvustama, et allergilised reaktsioonid võivad pärast sümptomaatilise ravi lõpetamist taasilmuda.

#### Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomadele manustava isikule

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, alla neelamisel ja kokkupuutel nahaga põhjustada allergianähte. Ülitundlikkus penitsilliinidele võib põhjustada ristreaktsioone tsefalosporiinidega ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid nendele ainetele võivad olla väga ägedad.

Teadaoleva ülitundlikkuse korral, või kui teil on soovitatud selliste ühenditega mitte töötada, ärge käsitsege seda preparaati.

Kokkupuutest hoidumiseks käsitseda seda preparaati ettevaatlikult, rakendades kõiki soovitatud ettevaatusabinõusid.

Kui pärast kokkupuudet ravimiga tekivad sümptomid nagu nahalööve või püsiv silmaärritus, kontakteeruda arstiga. Näo, huulte või silmade turse või hingamisraskused on raskemad sümptomid ja nõuavad viivitamatut arstiabi.

Kui olete allergiline penitsilliinidele või tsefalosporiinidele, vältige kontakti preparaadi jäätmematerjaliga. Kokkupuute korral pesta nahka seebi ja veega.

#### **4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)**

Väga harvadel juhtudel on täheldatud gastrointestinaalsete häirete esinemist nagu oksendamine ja/või diarröa.

Väga harvadel juhtudel on pärast preparaadi kasutamist ilmnenu neuroloogilisi nähte ja süstekoha reaktsioone.

#### **4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil**

Convenia ohutus koertele ja kassidele tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole tõestatud.

Ravitud loomi ei tohiks aretuses kasutada 12 nädala jooksul pärast viimast manustamist.

#### **4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed**

Samaaegne kasutamine teiste kõrge proteiinisisiduvusega ainetega (näit. furosemiid, ketokonasool või mittesteroidne põletikuvastane ravim (MSPVA-d)) võib tekitada konkurentsi tsefovetsiini siduvusega ja selle tõttu põhjustada kõrvaltoimeid.

#### **4.9 Annustamine ja manustamisviis**

Naha ja pehmete kudede infektsioonid koertel:

Ühekordne subkutaanne manustamine doosis 8 mg/kg kehamassi kohta (1 ml 10 kg kehamassi kohta). Vajadusel võib ravi korrata 14 päevase intervalliga veel kuni kolm korda. Vastavalt heale loomaarstlikule tavale peaks püoderma ravi jätkama ka pärast kliiniliste nähtude täielikku kadumist.

Gingivaal- ja periodontaalkudede rasked infektsioonid koertel:

Ühekordne subkutaanne manustamine doosis 8 mg/kg kehamassi kohta (1 ml 10 kg kehamassi kohta).

Naha ja pehmete kudede abstsessid ja haavad kassidel:

Ühekordne subkutaanne manustamine doosis 8 mg/kg kehamassi kohta (1 ml 10 kg kehamassi kohta). Vajadusel võib ravi korrata 14 päeva pärast esimest manustamist.

Kuseteede infektsioonid koertel ja kassidel:

Ühekordne subkutaanne manustamine doosis 8 mg/kg kehamassi kohta (1 ml 10 kg kehamassi kohta).

Süstelahuse manustamiskõlblikuks muutmiseks võtta kaasasolevast lahusti viaalist vajalik kogus lahustit (20 ml viaalis sisalduva 852 mg lüofiliseeritud pulbri manustamiskõlblikuks muutmiseks kasutada 10 ml lahustit, 5 ml viaalis sisalduva 340 mg lüofiliseeritud pulbri manustamiskõlblikuks muutmiseks kasutada 4 ml lahustit) ja lisada see lüofiliseeritud pulbri viaali. Loksutada viaali pulbri täieliku lahustumiseni.

### **Doseerimistabel**

<b>Looma kehamass (koerad ja kassid)</b>	<b>Manustatav kogus</b>
2,5 kg	0,25 ml
5 kg	0,5 ml
10 kg	1,0 ml
20 kg	2,0 ml
40 kg	4,0 ml
60 kg	6,0 ml

Et kindlustada õige doosi manustamine ja vältida alaannustamist, peab looma kehamassi võimalikult täpselt kindlaks määrama.

#### **4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel**

Noored koerad talusid korduvat manustamist (kaheksa korda) 14-päevase intervalliga viiekordses soovitatavas doosis hästi. Pärast esimest ja teist manustamist täheldati kerget mööduvat turset süstekohal. Ühekordne manustamine 22,5-kordses soovitatavas doosis põhjustas mööduva turse ja ebamugavustunde süstekohal.

Noored kassid talusid korduvat manustamist (kaheksa korda) 14-päevase intervalliga viiekordses soovitatavas doosis hästi. Ühekordne manustamine 22,5-kordses soovitatavas doosis põhjustas mööduva turse ja ebamugavustunde süstekohal.

#### **4.11 Keeluaeg (-ajad)**

Ei rakendata.

## **5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED**

Farmakoterapeutiline rühm: Antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks (tsefalosporiinid).  
ATCvet kood: QJ01DD91

### **5.1 Farmakodünaamilised omadused**

Tsefovetsiin on kolmanda põlvkonna tsefalosporiin, millel on laia spektriga antimikrobiaalne toime gram-positiivsete ja gram-negatiivsete bakterite vastu. Erinevalt teistest tsefalosporiinidest on toimeaine proteiiniga seonduv ja pika toimekestvusega. Nagu kõikide tsefalosporiinide puhul on tsefovetsiini toime tingitud bakteriraku seina sünteesi inhibeerimisest; tsefovetsiinil on bakteritsiidne toime.

Tsefovetsiin toimib *in-vitro* *Staphylococcus pseudointermedius*'e ja *Pasteurella multocida* vastu, mida seostatakse koerte ja kasside nahainfektsioonidega. Tundlikud on kasside abstsessidest isoleeritud anaeroobsed bakterid nagu *Bacteroides* spp. ja *Fusobacterium* spp.. Tundlikud on ka periodontaalhaigusega koertelt isoleeritud *Prophyromonas gingivalis* ja *Prevotella intermedia*. Lisaks toimib tsefovetsiin *in-vitro* *Escherichia coli* vastu, mida seostatakse koerte ja kasside kuseteede infektsioonidega.

Euroopas läbi viidud (Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Suurbritannia) MIC-uuringul (1999 - 2000) ja Euroopas korraldatud (Taani, Prantsusmaa, Hispaania ja Suurbritannia) kliinilise efektiivsuse ja ohutuse välikatsetel (2001-2003) kogutud andmed tsefovetsiini *in-vitro* toime kohta nende patogeenide vastu ja ka teiste naha ja kusteede patogeenide vastu on toodud järgnevalt.

Periodontaalisolaate koguti Euroopas läbi viidud (Prantsusmaa ja Belgia) kliinilise efektiivsuse ja ohutuse väliuuringul (2008).

Bakteriaalne patogeen	Päritolu	Isolaatide arv	Tsefovetsiini MIC (µg/ml)			
			Min	Max	MIC <sub>50</sub> <sup>1</sup>	MIC <sub>90</sub> <sup>2</sup>
<i>Staphylococcus pseudintermedius</i>	Koer	226	≤0,06	8	0,12	0,25
	Kass	44	≤0,06	8	0,12	0,25
β-hemolüütilised streptokokid	Koer	52	≤0,06	16	≤0,06	0,12
	Kass	34	≤0,06	1	≤0,06	0,12
<i>Koagulaas-negatiivsed stafülokoid.</i> <sup>4</sup>	Kass	16	0,12	32	0,25	8
<i>Staphylococcus aureus</i> <sup>3,4</sup>	Koer <sup>4</sup>	16	0,5	1	1	1
	Kass <sup>4</sup>	20	0,5	>32	1	16
<i>Koagulaas-positiivsed stafülokoid.</i> <sup>3,4</sup>	Koer <sup>4</sup>	24	0,12	>32	0,25	0,5
	Kass <sup>4</sup>					
<i>Escherichia coli</i>	Koer	167	0,12	>32	0,5	1
	Kass	93	0,25	8	0,5	1
<i>Pasteurella multocida</i>	Koer	47	≤0,06	0,12	≤0,06	0,12
	Kass	146	≤0,06	2	≤0,06	0,12
<i>Proteus spp.</i>	Koer	52	0,12	8	0,25	0,5
	Kass <sup>4</sup>	19	0,12	0,25	0,12	0,25
Enterobacter spp. <sup>4</sup>	Koer <sup>4</sup>	29	0,12	>32	1	>32
	Kass <sup>4</sup>	10	0,25	8	2	4
Klebsiella spp. <sup>4</sup>	Koer <sup>4</sup>	11	0,25	1	0,5	1
	Kass <sup>4</sup>					
<i>Prevotella spp.</i> (2003 uuring)	Koer <sup>4</sup>	25	≤0,06	8	0,25	2
	Kass	50	≤0,06	4	0,25	0,5
<i>Fusobacterium spp.</i>	Kass	23	≤0,06	2	0,12	1
<i>Bacteroides spp.</i>	Kass	24	≤0,06	8	0,25	4
<i>Prevotella spp.</i> (periodontaalne 2008)	Koer	29	≤0,008	4	0,125	1
<i>Porphyromonas spp.</i>	Koer	272	≤0,008	1	0,031	0,062

<sup>1</sup> Madalaim kontsentratsioon, mis täielikult inhibeerib nähtava kasvu vähemalt 50 % isolaatidest

<sup>2</sup> Madalaim kontsentratsioon, mis täielikult inhibeerib nähtava kasvu vähemalt 90 % isolaatidest

<sup>3</sup> Mõnel neist patogeenidest (näit. *S. aureus*) ilmnes loomulik *in vitro* resistentsus tsefovetsiinile

<sup>4</sup> Nende *in vitro* andmete kliinilist olulisust ei ole näidatud

Resistentsus tsefalosporiinidele tuleneb ensümaatilise inaktiveerimisest (beeta-laktamaasi tootmine), vähenenud läbitavusest poriinmutatsioonidele või muutusest väljavoolus või madala afiinsusega penitsilliiniduvate proteiinide valimisest. Resistentsus võib olla kromosoomiline või plasmiidkodeeritud ja võib üle kanduda transposoonide või plasmiidide vahendusel. Esineb ristresistentsus teiste tsefalosporiinide ja beeta-laktaam antibakteriaalsete ainetega.

Soovitava mikrobioloogilise murdepunkti  $S \leq 2$  µg/ml rakendamisel *Pasteurella multocida*, *Fusobacterium spp.* ja *Porphyromonas spp.* looduslikel isolaatidel tsefovetsiini vastu resistentsust ei avastatud. Soovitava mikrobioloogilise murdepunkti  $I \leq 4$  µg/ml rakendamisel oli tsefovetsiini resistentsus *S. pseudointermedius*'e ja beeta-hemolüütiliste streptokokkide isolaatidel alla 0,02 % ning *Prevotella intermedia* isolaatidel 3,4 %. Tsefovetsiinile resistentsete isolaatide osakaal *E. coli*'l, *Prevotella oralis*'el, *Bacteroides spp.*-l ja *Proteus spp.*-l oli vastavalt 2,3 %, 2,7 %, 3,1 % ja 1,4 %. Tsefovetsiinile resistentsete isolaatide osakaal koagulaas-negatiivsetel stafülokokkidel (näit. *S. xylosum*, *S. schleiferi*, *S. epidermidis*) on 9,5 %. *Pseudomonas spp.*, *Enterococcus spp.* ja *Bordetella bronchiseptica* isolaadid omavad loomulikku resistentsust tsefovetsiinile.

## 5.2 Farmakokineetilised andmed

Tsefovetsiinil on unikaalsed farmakokineetilised omadused ja äärmiselt pikk poolväärtusaeg nii koertel kui kassidel.

Manustatuna koertele ühekordselt subkutaanselt doosis 8 mg/kg kehamassi kohta oli imendumine kiire ja laialdane; tippkontsentratsioon plasmas oli 6 tunni pärast 120 µg/ml ja biosaadavus umbes 99 %. Tippkontsentratsioon koevedelikus – 31,9 µg/ml mõõdeti 2 päeva pärast manustamist. 14 päeva pärast manustamist oli keskmine tsefovetsiini kontsentratsioon plasmas 5,6 µg/ml. Seondumine plasmaproteiiniga on kõrge (96,0 % kuni 98,7 %) ja jaotusruumala madal (0,1 l/kg). Poolväärtusaeg on pikk – umbes 5,5 päeva. Tsefovetsiin väljutatakse peamiselt neerude kaudu. 14. päeval pärast manustamist oli kontsentratsioon uriinis 2,9 µg/ml.

Manustatuna kassidele ühekordselt subkutaanselt doosis 8 mg/kg kehamassi kohta oli imendumine kiire ja laialdane; tippkontsentratsioon plasmas oli 2 tunni pärast 141 µg/ml ja biosaadavus umbes 99 %. 14 päeva pärast manustamist oli keskmine tsefovetsiini kontsentratsioon plasmas 18 µg/ml. Seondumine plasmaproteiiniga on kõrge (rohkem kui 99 %) ja jaotusruumala madal (0,09 l/kg). Eliminatsiooni poolväärtusaeg on pikk – umbes 6,9 päeva. Tsefovetsiin väljutatakse peamiselt neerude kaudu. 10. ja 14. päeval pärast manustamist oli kontsentratsioon uriinis vastavalt 1,3 µg/ml ja 0,7 µg/ml. Pärast korduvate dooside manustamist täheldati tsefovetsiini taseme tõusu plasmas.

## 6. FARMATSEUTILISED ANDMED

### 6.1 Abiainete loetelu

Metüülparahüdroksübensoaat (E218)  
Propüülparahüdroksübensoaat (E216)  
Bensüülalkohol  
Naatriumtsitraad  
Naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks)  
Vesinikkloriidhape (pH kohandamiseks)  
Süstevesi

### 6.2 Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

### 6.3 Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat  
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 28 päeva.

Nagu ka teiste tsefalosopriinide puhul, võib valmisahuse värvus selle perioodi jooksul tumeneda. Kui lahust säilitatakse vastavalt soovitudele, siis see lahuse tugevust ei mõjuta.

### 6.4 Säilitamise eritingimused

Enne manustamiskõlblikuks muutmist:  
Hoida külmkapis (2 °C – 8 °C). Mitte lasta külmuda.  
Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist:  
Hoida külmkapis (2 °C – 8 °C). Mitte lasta külmuda.  
Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

## **6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis**

### Pulber:

5 ml või 20 ml I tüüpi klaasviaal kummikorgiga, suletud lahtiklõpsatava alumiiniumkinnitusega.

### Lahusti:

10 ml või 15 ml I tüüpi klaasviaal kummikorgiga, suletud lahtiklõpsatava alumiiniumkinnitusega.

Pakendi suurus: 1 viaal pulbriga ja 1 viaal lahustiga.

## **6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel**

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

## **7. MÜÜGILOA HOIDJA**

Zoetis Belgium SA  
Rue Laid Burniat 1  
1348 Louvain-la-Neuve  
Belgia

## **8. MÜÜGILOA NUMBRID**

EU/2/06/059/001 (20 ml viaal)

EU/2/06/059/002 (5 ml viaal)

## **9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV**

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 19/06/2006

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 15/06/2011

## **10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV**

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt  
<http://www.ema.europa.eu/>.

## **TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD**

Ei rakendata.



## **LISA II**

- A. RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA**
- B. HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD**
- C. RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID**

**A. RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA**

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Haupt Pharma Latina S.r.l  
S.S. 156 Km 47,600  
04100 Borgo San Michele  
Latina  
Itaalia

**B. HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD**

Retseptiravim.

Müügiloa hoidja peab informeerima Euroopa Komisjoni selle otsusega heaks kiidetud ravimpreparaadi turustamisplaanidest.

**C. RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID**

Ei kohaldata.

**III LISA**  
**PAKENDI MÄRGISTUS JA PAKENDI INFOLEHT**

## **A. PAKENDI MÄRGISTUS**

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

### VÄLINE PAPPKARP (SISALDAB LÜOFILISEERITUD PULBRI VIAALI JA LAHUSTI VIAALI)

20 ml viaal - 5 ml viaal

#### 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Convenia 80 mg/ml pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks koertele ja kassidele  
Tsefovetsiin

#### 2. TOIMEAINE JA ABIAINETE SISALDUS

Juhendile vastavalt valmistatud süstelahus sisaldab:

80,0 mg/ml tsefovetsiini (naatriumsoolana)

1,8 mg/ml metüülparahüdroksübensoati (E218)

0,2 mg/ml propüülparahüdroksübensoati (E216)

12,3 mg/ml bensüülalkoholi

#### 3. RAVIMVORM

Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks.

#### 4. PAKENDI SUURUS

10 ml (pärast manustamiskõlblikuks muutmist)

4 ml (pärast manustamiskõlblikuks muutmist)

#### 5. LOOMALIIGID

Koer, kass.

#### 6. NÄIDUSTUS(ED)

Teatud naha, pehmete kudede, kuseteede ja raskete periodontaalinfektsioonide raviks.

#### 7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

#### 8. KEELUAEG

**9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**10. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP {kuu/aasta}

Pärast lahuse valmistamist kasutada ära 28 päeva jooksul.

Kasutatav kuni:

**11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida külmkapis (2 °C – 8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult (enne ja pärast lahustamist).

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD  
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI  
PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON  
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

**14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Zoetis Belgium SA  
Rue Laid Burniat 1  
1348 Louvain-la-Neuve  
Belgia

**16. MÜÜGILOA NUMBRID**

EU/2/06/059/001  
EU/2/06/059/002

**17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER**

Lot {number}

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**

**ETIKETT (20 ml LÜOFILISEERITUD PULBRI VIAAL)**

**1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Convenia 80 mg/ml pulber süstelahuse valmistamiseks koertele ja kassidele

**2. TOIMEAINE(TE) KOGUS**

Iga viaal sisaldab 852 mg tsefovetsiini.

**3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI**

10 ml (pärast manustamiskõlblikuks muutmist).

**4. MANUSTAMISVIIS(ID)**

Subkutaaneks manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**5. KEELUAEG**

**6. PARTII NUMBER**

Lot {number}

**7. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP {kuu/aasta}

Pärast lahuse valmistamist kasutada ära 28 päeva jooksul.

Kasutatav kuni:

**8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**

**ETIKETT (15 ml LAHUSTI VIAAL)**

**1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Convenia lahusti

**2. TOIMEAINE JA ABIAINETE SISALDUS**

13 mg/ml bensüülalkoholi süstevees

**3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI**

10 ml

**4. MANUSTAMISVIIS(ID)**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**5. KEELUAEG**

**6. PARTII NUMBER**

Lot {number}

**7. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP {kuu/aasta}

**8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.



**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**

**ETIKETT (5 ml LÜOFILISEERITUD PULBRI VIAAL)**

**1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Convenia 80 mg/ml pulber süstelahuse valmistamiseks koertele ja kassidele

**2. TOIMEAINE(TE) KOGUS**

340 mg tsefovetsiini

**3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI**

4 ml (pärast manustamiskõlblikuks muutmist).

**4. MANUSTAMISVIIS(ID)**

Subkutaanseks manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**5. KEELUAEG**

**6. PARTII NUMBER**

Lot {number}

**7. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP {kuu/aasta}

Pärast lahuse valmistamist kasutada ära 28 päeva jooksul.

**8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**

**ETIKETT (10 ml LAHUSTI VIAAL)**

**1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Convenia lahusti

**2. TOIMEAINE JA ABIAINETE SISALDUS**

13 mg/ml bensüülalkoholi

**3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI**

4 ml

**4. MANUSTAMISVIIS(ID)**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**5. KEELUAEG**

**6. PARTII NUMBER**

Lot {number}

**7. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP {kuu/aasta}

**8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

## **B. PAKENDI INFOLEHT**

## PAKENDI INFOLEHT

Convenia 80 mg/ml pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks koertele ja kassidele

### 1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:  
Zoetis Belgium SA  
Rue Laid Burniat 1  
1348 Louvain-la-Neuve  
Belgia

Partii vabastamise eest vastutav tootja:  
Haupt Pharma Latina S.r.l  
S.S. 156 Km 47,600  
04100 Borgo San Michele  
Latina  
Itaalia

### 2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Convenia 80 mg/ml pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks koertele ja kassidele  
Tsefovetsiin

### 3. TOIMEAINE JA ABIAINETE SISALDUS

Iga 20 ml viaal lüofiliseeritud pulbrit sisaldab:

**Toimeained:**  
852 mg tsefovetsiini (naatriumsoolana)

**Abiained:**  
19,17 mg metüülparahüdroksübensoaati (E218)  
2,13 mg propüülparahüdroksübensoaati (E216)

Iga 15 viaal lahustit sisaldab:

**Abiained:**  
13 mg/ml bensüülalkoholi  
10,8 ml süstevett

Iga 5 ml viaal lüofiliseeritud pulbrit sisaldab:

**Toimeained:**  
340 mg tsefovetsiini (naatriumsoolana)

**Abiained:**  
7,67 mg metüülparahüdroksübensoaati (E218)  
0,85 mg propüülparahüdroksübensoaati (E216)

Iga 10 viaal lahustit sisaldab:

**Abiained:**  
13 mg/ml bensüülalkoholi  
4,45 ml süstevett

Juhendile vastavalt manustamiskõlblikuks muudetud süstelahus sisaldab:

80,0 mg/ml tsefovetsiini (naatriumsoolana)  
1,8 mg/ml metüülparahüdroksübensoaati (E218)  
0,2 mg/ml propüülparahüdroksübensoaati (E216)  
12,3 mg/ml bensüülalkoholi

### 4. NÄIDUSTUSED

Kasutada ainult järgnevate pikaajalist ravi vajavate infektsioonide raviks. Convenia antimikroobne toime pärast üht süsti kestab kuni 14 päeva.

Koer:

*Staphylococcus pseudointermedius*'e,  $\beta$ -hemolüütiliste streptokokkide, *Escherichia coli* ja/või *Pasteurella multocida* põhjustatud naha ja pehmete kudede infektsioonide, kaasa arvatud püoderma, haavade ja abstsesside raviks.

*Escherichia coli* ja/või *Proteus* spp põhjustatud kuseteede infektsioonide raviks.

Toetava ravina mehaanilisele või kirurgilisele periodontaalravile *Porphyromonas* spp. ja *Prevotella* spp. põhjustatud igemete ja periodontaalkudede raskete infektsioonide ravis (vt. ka lõik 12 „Erihoiatused - Loomale“).

Kass:

*Pasteurella multocida*, *Fusobacterium* spp., *Bacteroides* spp., *Prevotella oralis*'e,  $\beta$ -hemolüütiliste streptokokkide ja/või *Staphylococcus pseudointermedius*'e põhjustatud naha ja pehmete kudede abstsesside ja haavade raviks.

*Escherichia coli* põhjustatud kuseteede infektsioonide raviks.

## **5. VASTUNÄIDUSTUSED**

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tsefalosporiini ja penitsilliini rea antibiootikumide suhtes. Mitte kasutada väikestel herbivooridel (sealhulgas meriseal ja küülikul). Mitte kasutada noorematel kui 8 nädala vanustel koertel ja kassidel.

## **6. KÕRVALTOIMED**

Väga harvadel juhtudel on täheldatud gastrointestinaalsete häirete esinemist nagu oksendamine ja/või diarröa.

Väga harvadel juhtudel on pärast preparaadi kasutamist ilmnenud neuroloogilisi nähte ja süstekoha reaktsioone.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

## **7. LOOMALIIGID**

Koer, kass.

## **8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD**

Koertele ja kassidele: 8 mg tsefovetsiini / kg kehamassi kohta ( 1 ml / 10 kg kehamassi kohta).

## Doseerimistabel

Looma kaal (koerad ja kassid)	Manustatav kogus
2,5 kg	0,25 ml
5 kg	0,5 ml
10 kg	1,0 ml
20 kg	2,0 ml
40 kg	4,0 ml
60 kg	6,0 ml

Süstelahuse valmistamiseks võtta kaasasolevast lahusti viaalist vajalik kogus lahustit (20 ml viaalis sisalduva 852 mg lüofiliseeritud pulbri manustamiskõlblikuks muutmiseks kasutada 10 ml lahustit, 5 ml viaalis sisalduva 340 mg lüofiliseeritud pulbri manustamiskõlblikuks muutmiseks kasutada 4 ml lahustit) ja lisada see lüofiliseeritud pulbri viaali. Loksutada viaali pulbri täieliku lahustumiseni.

### Naha ja pehmete kudede infektsioonid koertel:

Ühekordne subkutaanne manustamine. Vajadusel võib ravi korrata 14 päevase intervalliga veel kuni kolm korda. Vastavalt heale loomaarstlikule tavale peaks püoderma ravi jätkama ka pärast kliiniliste nähtude täielikku kadumist.

### Gingivaal- ja periodontaalkoe rasked infektsioonid koertel:

Ühekordne subkutaanne manustamine doosis 8 mg/kg kehamassi kohta (1 ml 10 kg kehamassi kohta).

### Naha ja pehmete kudede infektsioonid kassidel:

Ühekordne subkutaanne manustamine. Vajadusel võib ravi korrata 14 päeva pärast esimest manustamist.

### Kuseteede infektsioonid koertel ja kassidel:

Ühekordne subkutaanne manustamine.

## 9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Et kindlustada õige doosi manustamine ja vältida alaannustamist, peab looma kehamassi võimalikult täpselt kindlaks määrama.

Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.

Püoderma on sageli sekundaarne haigus. Selle tõttu on soovitatav kindlaks teha esmane haigus ja ravida looma vastavalt.

## 10. KEELUAEG

Ei rakendata.

## 11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.

Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 28 päeva.

Nagu ka teiste tsefalosporiinide puhul, võib valmisahuse värvus selle perioodi jooksul tumeneda. Kui lahust säilitatakse vastavalt soovitudele, siis see lahuse tugevust ei mõjuta.

#### Enne valmissegamist:

Hoida külmkapis (2 °C – 8 °C). Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult (enne ja pärast lahustamist)..

#### Pärast valmissegamist:

Hoida külmkapis (2 °C – 8 °C). Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult (enne ja pärast lahustamist)..

## **12. ERIHOIATUSED**

### Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Kolmanda põlvkonna tsefalosporiine on mõistlik kasutada selliste kliiniliste seisundite raviks, mille puhul ei ole andnud piisavat tulemust või mille puhul oletatakse ebapiisavat tulemust teiste antimikrobiaalsete ravimitega või esimese põlvkonna tsefalosporiinidega. Preparaadi kasutamise aluseks peab olema tundlikkustest ja tuleb arvestada kohalikku ametlikku antimikrobiaalse ravi poliitikat.

Põhitingimus periodontaalhaiguse raviks on mehaaniline ja/või kirurgiline veterinaarne sekkumine.

Convenia ohutus koertele ja kassidele tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole tõestatud. Ravitud loomi ei tohiks aretuses kasutada 12 nädala jooksul pärast viimast manustamist.

Convenia ohutust raske neerupuudulikkusega loomadele ei ole uuritud.

Loomade puhul, kellel on varem esinenud ülitundlikkusreaktsioone tsefovetsiinile, teistele tsefalosporiinidele, penitsilliinidele või teistele ravimitele, peab preparaadi kasutamisel olema ettevaatlik. Allergiliste reaktsioonide ilmnemisel ei tohi tsefovetsiini rohkem manustada ja peab määrama sobiva ravi beeta-laktaamülitundlikkusreaktsiooni kõrvaldamiseks. Rasked ägedad ülitundlikkusreaktsioonid võivad vajada ravi epinefriiniga ja teisi intensiivravi meetodeid, kaasa arvatud hapniku, intravenoosne vedeliku, intravenoosne antihistamiinide, kortikosteroidide manustamine ja hingamisteede kontroll vastavalt kliinilistele nähtudele. Veterinaarid peavad teadvustama, et allergilised reaktsioonid võivad pärast sümptomaatilise ravi lõpetamist taasilmuda.

Samaaegne kasutamine teiste kõrge proteiinisisiduvusega ainete (näit. furosemiid, ketokonasool või mittesteroidne põletikuvastane ravim (MSPVA-d)) võib tekitada konkurentsi tsefovetsiini siduvusega ja selle tõttu põhjustada kõrvaltoimeid.

Noored koerad talusid korduvat manustamist (kaheksa korda) 14-päevase intervalliga viiekordses soovitatavas doosis hästi. Pärast esimest ja teist manustamist täheldati kerget mööduvat turset süstekohal. Ühekordne manustamine 22,5-kordses soovitatavas doosis põhjustas mööduva turse ja ebamugavustunde süstekohal.

Noored kassid talusid korduvat manustamist (kaheksa korda) 14-päevase intervalliga viiekordses soovitatavas doosis hästi. Ühekordne manustamine 22,5-kordses soovitatavas doosis põhjustas mööduva turse ja ebamugavustunde süstekohal.

### Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomadele manustava isikule

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, alla neelamisel ja kokkupuutel nahaga põhjustada allergianähte. Ülitundlikkus penitsilliinidele võib põhjustada ristreaktsioone tsefalosporiinidega ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid nendele ainetele võivad olla väga ägedad.

Teadaoleva ülitundlikkuse korral või kui teil on soovitatud selliste ühenditega mitte töötada, ärge käsitsege seda toodet.

Kokkupuutest hoidumiseks käsitseda seda preparaati ettevaatlikult, rakendades kõiki soovitatud ettevaatusabinõusid.

Kui pärast kokkupuudet ravimiga tekivad sümptomid nagu nahalööve või püsiv silmaärritus, kontakteeruda arstiga. Näo, huulte või silmade turse või hingamisraskused on raskemad sümptomid ja nõuavad viivitamatut arstiabi.

Kui olete allergiline penitsilliinidele või tsefalosporiinidele, vältige kontakti preparaadi jäätmematerjaliga. Kokkupuute korral peata nahka seebi ja veega.

### **13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

### **14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt <http://www.ema.europa.eu/>.

### **15. LISAINFO**

Tsefovetsiin on kolmanda põlvkonna tsefalosporiin, mille on laia spektriga antimikrobiaalne toime gram-positiivsete ja gram-negatiivsete bakterite vastu. Erinevalt teistest tsefalosporiinidest on see proteiiniga seonduv ja pika toimekestvusega. Nagu kõikide tsefalosporiinide puhul, on tsefovetsiini toime tingitud bakteriraku seinä sünteesi inhibeerimisest; tsefovetsiinil on bakteritsiidne toime.

Tsefovetsiin toimib *in-vitro* *Staphylococcus pseudointermedius*'e ja *Pasteurella multocida* vastu, mida seostatakse koerte ja kasside nahainfektsioonidega. Tundlikud on kasside abstsessidest isoleeritud anaeroobsed bakterid nagu *Bacteroides* spp. ja *Fusobacterium* spp. Tundlikud on ka periodontaalhaigusega koertelt isoleeritud *Prophyromonas gingivalis* ja *Prevotella intermedia*.. Lisaks toimib tsefovetsiin *in-vitro* *Escherichia coli* vastu, mida seostatakse koerte ja kasside kusetee infektsioonidega.

Resistentsus tsefalosporiinidele tuleneb ensümaatilise inaktiveerimisest (beeta-laktamaasi tootmine) või teistest mehhanismidest. Resistentsus võib olla kromosoomiline või plasmiidkodeeritud ja võib üle kanduda transposoonide või plasmiidide vahendusel. Esineb ristresistentsus teiste tsefalosporiinide ja beeta-laktaam antibakteriaalsete ainetega. Soovitava mikrobioloogilise murdepunkti  $S \leq 2$  µg/ml rakendamisel *Pasteurella multocida*, *Fusobacterium* spp. ja *Porphyromonas* spp. looduslikel isolaatidel tsefovetsiini vastu resistentsust ei avastatud. Soovitava mikrobioloogilise murdepunkti  $I \leq 4$  µg/ml rakendamisel oli tsefovetsiini resistentsus *S. pseudointermedius*'e ja beeta-hemolüütiliste streptokokkide isolaatidel alla 0,02 % ning *Prevotella intermedia* isolaatidel 3,4 %. Tsefovetsiinile resistentsete isolaatide osakaal *E. coli*'l, *Prevotella oralis*'el, *Bacteroides* spp.-l ja *Proteus* spp.-l oli vastavalt 2,3 %, 2,7 %, 3,1 % ja 1,4 %. Tsefovetsiinile resistentsete isolaatide osakaal koagulaas-negatiivsetel stafülokokkidel (näit. *S. xylosus*, *S. schleiferi*, *S. epidermidis*) on 9,5 %. *Pseudomonas* spp., *Enterococcus* spp, ja *Bordetella bronchiseptica* isolaadid omavad loomulikku resistentsust tsefovetsiinile.



Tsefovetsiinil on unikaalsed farmakonkineetilised omadused ja äärmiselt pikk poolväärtusaeg nii koertel kui kassidel.

Preparaat on saadaval ühes 5 ml või 20 ml pakendis, mis koosneb külmuivatatud pulbri viaalist ja lahustiviaalist. Manustamiskõlblikuks muutmisel saadakse vastavalt 4 ml või 10 ml süstelahust. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

**België/Belgique/Belgien**

Zoetis Belgium SA  
Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

**Република България**

Zoetis Belgium SA  
Тел: +359 2 4775791

**Česká republika**

Zoetis Česká republika, s.r.o.  
Tel: +420 257 101 111

**Danmark**

Orion Pharma Animal Health  
Tlf: +45 86 14 00 00

**Deutschland**

Zoetis Deutschland GmbH  
Tel: +49 30 330063 0

**Eesti**

Oriola Vilnius UAB  
Tel: +370 610 05088

**Ελλάδα**

Zoetis Hellas S.A.  
Τηλ.: +30 210 6791900

**España**

Zoetis Spain, S.L.  
Tel: +34 91 4191900

**France**

Zoetis France  
Tél: +33 (0)810 734 937

**Hrvatska**

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu  
Tel: +385 1 644 1460

**Ireland**

Zoetis Belgium SA  
Tel: +353 (0) 1 256 9800

**Lietuva**

Oriola Vilnius UAB  
Tel: +370 610 05088

**Luxembourg/Luxemburg**

Zoetis Belgium SA  
Tél/Tel.: +352 8002 4026

**Magyarország**

Zoetis Hungary Kft.  
Tel: +361 224 5222

**Malta**

Agrimed Limited  
Tel: +356 21 465 797

**Nederland**

Zoetis B.V.  
Tel: +31 (0)10 714 0900

**Norge**

Orion Pharma Animal Health  
Tlf: +47 40 00 41 90

**Österreich**

Zoetis Österreich GmbH  
Tel: +43 1 2701100 110

**Polska**

Zoetis Polska Sp. z o.o.  
Tel: +48 22 2234800

**Portugal**

Zoetis Portugal, Lda.  
Tel: +351 21 042 72 00

**România**

Zoetis România SRL  
Tel: +40 21 202 3083

**Slovenija**

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu  
Tel: +385 1 644 1460

**Ísland**

Icepharma hf.  
Sími: +354 540 80 00

**Italia**

Zoetis Italia S.r.l.  
Tel: +39 06 3366 8133

**Κύπρος**

Zoetis Hellas S.A.  
Τηλ.: +30 210 6791900

**Latvija**

Oriola Vilnius UAB  
Tel: +370 610 05088

**Slovenská republika**

Zoetis Česká republika, s.r.o.  
Tel: +420 257 101 111

**Suomi/Finland**

Zoetis Finland Oy  
Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

**Sverige**

Orion Pharma Animal Health  
Tel: +46 (0)8 623 64 40

**United Kingdom**

Zoetis UK Limited  
Tel: +44 (0) 845 300 8034