



HUR MAN BEDÖVAR/AVLIVAR FJÄDERFÄN PÅ GÅRDEN

Fjäderfän som inte kan transporteras måste avlivas på gården. De kan också avlivas på gården av andra orsaker så som sjukdom, långsam tillväxt eller för att tillhandahålla kött direkt till konsumenter/återförsäljare. Föregående bedövning är obligatorisk i alla fall. Bedöva och **avliva dem så snart som möjligt** så att döden blir smärtfri.

Den här informationen åsidosätter inte **nationella regler** som förbjuder eller begränsar någon av dessa metoder.

Bedövning och avlivning måste utföras av arbetare som innehar rätt kompetensnivå.

OM FJÄDERFÄN

- ✦ Fjäderfän är sociala djur men de kan lätt få panik
- ✦ **Gillar:** välupplysta utrymmen
- ✦ **Ogillar:** direkt solljus, drag

KOM IHÅG

- ✦ Skadade fåglar kanske inte kan röra sig utan smärta. Bedöva och avliva dem där de är **så snabbt som möjligt**

BEDÖVNING/AVLIVNING

När fjäderfäna är fixerade, kan du överväga följande metoder:

1. BEDÖVNING AV ENBART HUVUDET



Eftersom den här metoden kanske inte dödar fjäderfäet, måste du avbloda det inom 15 sekunder.

Positionera elektroderna

Elektroderna placeras runt fågelns huvud, mellan ögat och örat

Kontrollera inställningarna

- ✦ Strömstyrka: höns 240 mA, kalkoner 400 mA eller högre
- ✦ Spänning: över 110 V
- ✦ Varaktighet: minst 7 sekunder



2. PENETRERANDE/ICKE-PENETRERANDE BULTPISTOL


En penetrerande bultpistol avfyras genom skallen in i hjärnan.
En icke-penetrerande bultpistol träffar pannan utan att gå igenom skallen.

Positionera bultpistolen

- ✦ Placera bultpistolen ovanpå huvudet och sikta nedåt

Kontrollera parametrarna

- ✦ Läs tillverkarens instruktioner för att kontrollera att bultpistolen, laddningen och trycket är rätt.
- ✦ Icke-penetrerande: platt huvud för höns; konvext för ankor, gäss och kalkoner
- ✦ Avliva genom att avbloda inom 1 minut



3. HALSDISLOKATION

Halsdislokation (eller sträckning) skiljer ryggraden från huvudet.
Du får inte avliva fler än 70 fåglar om dagen med den här metoden.

Håll fast och positionera fågeln

- ✦ Använd en hand för att lyfta upp och hålla fast fågeln i benen
- ✦ Stäng fingrarna på din andra hand runt fågelns hals från bakom dess skalle
- ✦ I en enda rörelse:
 1. Dra båda händerna snabbt och bestämt åt varsitt håll
 2. Dra huvudet skarpt bakåt



4. SLAG MOT HUVUDET


Du får inte avliva fler än 70 fåglar om dagen med den här metoden.

Håll fast och positionera fågeln

- ✦ Håll fågeln i benen
- ✦ Lägg dess huvud på en hård yta
- ✦ Slå fågeln i bakhuvudet med ett tung, lätthanterligt föremål

Kontrollera om djuret är medvetslöst

Efter att du använt bultpistol, slag mot huvudet eller dislokationsmetoden, kontrollera för:



EFTER BEDÖVNINGEN

Om fågeln fortfarande är vid medvetande:

- ✦ Avbloda inte
- ✦ Bedöva igen med en reservmetod
- ✦ Identifiera vad som gick fel
- ✦ Rätta till eventuella problem innan du fortsätter skjuta

För att bekräfta att fågeln är död, kontrollera att:

- ✦ Det inte finns några spontana rörelser
- ✦ Kropp/vingar är slappa
- ✦ Den inte andas
- ✦ Det har slutat blöda